



Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Peritonealdialyslösning med tillsats av:

Tobramycin 10 mg/mL (Nebcina), se spädning nedan
 Vankomycin 50 mg/mL, se spädning nedan
 Heparin 5000 E/mL (vid fibrinbildning)

EN-STEGSSPÄDNING Tobramycin

Tobramycin		NaCl 9 mg/mL		LÖSN
40 mg/mL	+		=	10 mg/mL
2 mL		6 mL		8 mL

EN-STEGSSPÄDNING Vankomycin

Vankomycin		Sterilt Vatten		LÖSN
500 mg	+		=	50 mg/mL
1 st		10 mL		10 mL

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intraperitonealt

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Peritonit i samband med peritonealdialys

Barn 1 mån - 18 år:

APD

Tobramycin 10 mg/mL: 0,4 mL (4 mg)/L dialysat

Vankomycin 50 mg/mL: 0,3 mL (15 mg)/L dialysat

CAPD

Tobramycin 10 mg/mL: 0,6 mL (6 mg)/L dialysat

Vankomycin 50 mg/mL: 0,5 mL (25 mg)/L dialysat

Vid fibrinbildning tillsätts Heparin 5000 E/mL. Rutindos om ej särskild ordination finns: 250 E/L dialysat

ÖVRIG INFORMATION

APD = automatisk peritonealdialys

CAPD = kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3086

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-04-09

ePedID: 3086

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-04-14

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-04-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tobramycin (från registrerad produkt)

40 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Brytampull, får ej sparas efter första uttag.

10 mg/mL, Lösning (eget)

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur.

Vankomycin (från registrerad produkt)

500 mg, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i ytterförpackningen, ljuskänsligt.

50 mg/mL, Lösning (eget)

HÅLLBAR: Sparas ej pga förväxlingsrisk.