



Flutikason inhalation

(ex Flutide, Icsori)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 50 mikrog/dos (Flutide Evohaler)
Inhalationsspray 125, 250 mikrog/dos (ex Icsori)
Inhalationspulver 50, 100, 250, 500 mikrog/dos (Flutide Diskus)

ADMINISTRERING

Inhalation:
Patienten bör skölja munnen med vatten efter varje administrering.

Inhalationsspray används tillsammans med en andningsbehållare (spacer) och vid behov mask. Håll masken tätt över mun och näsa, så snart barnet klarar det bör munstycke användas då det ger bättre utbyte (från ca 3 års ålder).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flutikason (registrerad produkt)

Inhalationsspray, suspension

Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot kyla och direkt solljus. Får ej frysas.
Gäller alla styrkor och alla tillverkare.

Inhalationspulver, avdelad dos

Förvaras vid högst 30 °C. Efter att foliepåsen öppnats ska läkemedlet förvaras torrt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Infektionsutlöst astma (periodisk behandling)

Barn 1 mån - 5 år:

Dag 1 - 3: 125 mikrog x 4

Dag 4 - 10: 125 mikrog x 2

Om symtomen har försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas.

Vid svåra episoder eller förekomst mer än en gång per månad bör kontinuerlig lågdosbehandling ges.

Underhållsbehandling av astma

Barn 1 mån - 11 år:

Låg dos: 50 mikrog x 1 - 2

Medelhög dos: 50 - 125 mikrog x 2

Hög dos: 125 - 250 mikrog x 2

Barn 12 - 18 år:

Låg dos: 50 - 125 mikrog x 2

Medelhög dos: 125 - 250 mikrog x 2

Hög dos: 250 - 500 mikrog x 2, max 2000 mikrog/DYGN

Vilken dos som används styrs av patientens symtom, se behandlingstrappa i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Astma hos barn och vuxna (finns som klickbar referens).

ÖVRIG INFORMATION

Många av doserna ovan är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.





Flutikason inhalation

(ex Flutide, Icsori)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator (VGR)

[https://mellanarkiv-](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-685/surrogate/Terapir%C3%A5d%20Val%20av%20spacer%20vid%20f%C3%B6rskrivning%20av%20spray%20inhalator.pdf)

[offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-685/surrogate/Terapir%C3%A5d%20Val%20av%20spacer%20vid%20f%C3%B6rskrivning%20av%20spray inhalator.pdf](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-685/surrogate/Terapir%C3%A5d%20Val%20av%20spacer%20vid%20f%C3%B6rskrivning%20av%20spray%20inhalator.pdf)

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna

www.lakemedelsverket.se/astma

PubMed PMID Cochrane Library Syst Rev 2019 Axelsson I et al: Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31194879>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3093

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-02-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT