

Flutikason inhalation

(Flutide Evohaler)

Flutide Evohaler finns i två styrkor; 50 mikrogram/dos samt 125 mikrogram/dos.

Administreringsätt

Inhalation: För att få bättre terapeutisk effekt hos de patienter (speciellt mindre barn) som har svårigheter att koordinera inhalation och sprayavtryck, rekommenderas att Flutide Evohaler används tillsammans med en andningsbehållare (spacer), t ex Vortex, Optichamber, L'espace, Nebunette.

Vanlig indikation och dos

Periodisk behandling av astma

Barn 0 - 18 år:

Dag 1 - 4: 125 mikrogram x 4

Dag 5 - 11: 125 mikrogram x 2

Om symtomen har försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas.

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-14 10:25:32
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-21 08:59:05
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3093
ID/spårnummer: 3408
Giltig fr o m: 2017-06-21 08:59:05
Utskriftsdatum: 2017-06-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flutikason inhalation

(Flutide Evohaler)

Underhållsbehandling av astma

Barn under 6 år

Låg dos: 100 mikrogram/dygn
Medelhög dos: 200 mikrogram/dygn
Hög dos: Över 200 mikrogram/dygn

Steg 1: Periodiska besvär vid förkylning (se indikation ovan)

Steg 2: Besvär mellan förkylningar och/eller infektionsutlöst astma mer än 1 gång per månad

Regelbunden underhållsbehandling med inhalationssteroid i låg - medelhög dos, alternativt leukotrienantagonist i monoterapi vid lindrigare besvär

Steg 3: Bristande kontroll trots behandling enligt steg 2
Som steg 2, men i kombination med leukotrienantagonist

Steg 4: Fortsatt bristande kontroll trots behandling enligt steg 3
Regelbunden underhållsbehandling med inhalationssteroid i hög dos i kombination med leukotrienantagonist

Underhållsbehandling av astma

Barn över 6 år

Låg dos: 200 mikrogram/dygn
Medelhög dos: 500 mikrogram/dygn
Hög dos: Över 500 mikrogram/dygn

Steg 1: Periodiska besvär (se indikation ovan)

Steg 2: Återkommande ansträngningsutlösta besvär och/eller behov av beta 2-stimulerare mer än 2 ggr /vecka:

Inhalationssteroid i låg - medelhög dos, alternativt leukotrienantagonist i monoterapi

Steg 3: Bristande kontroll trots behandling enligt steg 2
Som steg 2, men i kombination med leukotrienantagonist och/eller långverkande beta-2-stimulerare

Steg 4: Fortsatt bristande kontroll trots behandling enligt steg 3
Som steg 3, men med inhalationssteroid i hög dos

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-14 10:25:32
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-21 08:59:05
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3093
ID/spårnummer: 3408
Giltig fr o m: 2017-06-21 08:59:05
Utskriftsdatum: 2017-06-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flutikason inhalation (Flutide Evohaler)

Övrig information

Många av doserna är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.

Referens/Länk

Internetadress Barnallergisektionen. Underhållsbehandling av astma hos barn.

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d10_underhallsbeh_astma.pdf

Internetadress Läkemedelsverket, behandlingsrekommendation Astma

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Astma/>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Fluticasone, R03BA05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POFHUAZLQVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-14 10:25:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-21 08:59:05

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3093

ID/spårnummer: 3408

Giltig fr o m: 2017-06-21 08:59:05

Utskriftsdatum: 2017-06-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

