



Flutikason inhalation

(ex Flutide Evohaler)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 50 mikrog/dos (Flutide Evohaler) samt 125 mikrog/dos (Flutide Evohaler samt Fluticasone Cipla)

ADMINISTRERINGSSÄTT

SPACER

För att få terapeutisk effekt rekommenderas att inhalationssprayen används tillsammans med en andningsbehållare (spacer), t ex Vortex, Optichamber, L´espace, Nebunette. Håll masken tätt över mun och näsa.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Periodisk behandling av astma

Barn 1 mån - 18 år:

Dag 1 - 4: 50 - 125 mikrogram x 1 - 4

Dag 5 - 11: 50 - 125 mikrogram x 2

Om symtomen har försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas.

Underhållsbehandling av astma

Barn 1 mån - 5 år:

Låg dos: 50 - 100 mikrogram/dygn

Medelhög dos: 200 mikrogram/dygn

Hög dos: Över 200 mikrogram/dygn

Barn 6 - 18 år:

Låg dos: 100 - 200 mikrogram/dygn

Medelhög dos: 250 - 500 mikrogram/dygn

Hög dos: Över 500 mikrogram/dygn

Vilken dos som används styrs av patientens symtom, se Behandlingstrappa under Övrigt.





Flutikason inhalation

(ex Flutide Evohaler)

ÖVRIG INFORMATION

Många av doserna är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.

BEHANDLINGSTRAPPA, BARN 0 - 5 ÅR:

Steg 1: Periodiska besvär vid förkylning (se indikation periodisk behandling av astma)

Steg 2: Besvär mellan förkylningar och/eller infektionsutlöst astma mer än 1 gång per månad

Regelbunden underhållsbehandling med inhalationssteroid i låg - medelhög dos, alternativt leukotrienantagonist i monoterapi vid lindrigare besvär

Steg 3: Bristande kontroll trots behandling enligt steg 2

Som steg 2, men i kombination med leukotrienantagonist

Steg 4: Fortsatt bristande kontroll trots behandling enligt steg 3

Regelbunden underhållsbehandling med inhalationssteroid i hög dos i kombination med leukotrienantagonist

BEHANDLINGSTRAPPA, BARN 6 - 18 ÅR:

Steg 1: Periodiska besvär (se indikation periodisk behandling av astma)

Steg 2: Återkommande ansträngningsutlösta besvär och/eller behov av beta 2-stimulerare mer än 2 ggr/vecka:

Inhalationssteroid i låg - medelhög dos, alternativt leukotrienantagonist i monoterapi

Steg 3: Bristande kontroll trots behandling enligt steg 2

Som steg 2, men i kombination med leukotrienantagonist och/eller långverkande beta-2-stimulerare

Steg 4: Fortsatt bristande kontroll trots behandling enligt steg 3

Som steg 3, men med inhalationssteroid i hög dos





Flutikason inhalation

(ex Flutide Evohaler)

REFERENS/LÄNK

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling vid Astma

<https://lv.se/astma>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi -
Underhållsbehandling av astma hos barn.

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d10_underhallsbeh_astma.pdf

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-01-14

ePedID: 3093

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-01-15

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-01-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT