



## Flutikason inhalation/lokalt

(ex Flutide Evohaler)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 50 mikrog/dos (Flutide Evohaler)

Inhalationsspray 125 mikrog/dos (ex Icsori)

### ADMINISTRERING

Inhalation:

Patienten bör skölja munnen med vatten efter varje administrering.

Används tillsammans med en andningsbehållare (spacer) och vid behov mask. Håll masken tätt över mun och näsa, så snart barnet klarar det bör munstycke användas då det ger bättre utbyte (från ca 3 års ålder).

Lokalt:

Vid indikation eosinofil esofagit ska flutikason sprejas långt bak i svalget och sväljas, dvs inte inhaleras.

Patienten ska svälja efter varje enskild sprejning.

Mat och dryck ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofagusslemhinnan.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Flutikason (registrerad produkt)

Inhalationsspray, suspension

Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot kyla och direkt solljus. Får ej frysas.

Gäller båda styrkorna och alla tillverkare.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Infektionsutlöst astma (periodisk behandling)

Barn 1 mån - 5 år:

Dag 1 - 3: 125 mikrog x 4

Dag 4 - 10: 125 mikrog x 2

Om symtomen har försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas.

Vid svåra episoder eller förekomst mer än en gång per månad bör kontinuerlig lågdosbehandling ges.

#### Underhållsbehandling av astma

Barn 1 mån - 11 år:

Låg dos: 50 mikrog x 1 - 2

Medelhög dos: 50 - 125 mikrog x 2

Hög dos: 125 - 250 mikrog x 2

Barn 12 - 18 år:

Låg dos: 50 - 125 mikrog x 2

Medelhög dos: 125 - 250 mikrog x 2

Hög dos: 250 - 500 mikrog x 2, max 2000 mikrog/DYGN

Vilken dos som används styrs av patientens symtom, se behandlingstrappa i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Astma hos barn och vuxna (finns som klickbar referens).





## Flutikason inhalation/lokalt

(ex Flutide Evohaler)

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Eosinofil esofagit

Bör ordineras av eller i samråd med barn gastroenterolog.  
OBS - läkemedlet ska sprejas långt bak i svalget och sväljas, dvs inte inhaleras.

Barn 1 mån - 7 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 250 - 375 mikrog x 2

Underhållsbehandling: 125 - 250 mikrog x 2

Barn 8 - 18 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 375 - 875 mikrog x 2

Underhållsbehandling: 250 - 375 mikrog x 2

Patienten ska svälja efter varje enskild sprejning.

Mat och dryck ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofagusslemhinnan.

### ÖVRIG INFORMATION

Många av doserna ovan är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.





## Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler)

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator (VGR)

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS8865-801931069-33/SURROGATE/Val%20av%20spacer%20vid%20f%c3%b6rskrivning%20av%20sprayinhalator%20januari%202018.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna

[www.lakemedelsverket.se/astma](http://www.lakemedelsverket.se/astma)

PubMed PMID Cochane Library Syst Rev 2019 Axelsson I et al: Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31194879>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3093

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-12-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**