



Alimemazin oralt 40 mg/mL

(fd Theralen) orala droppar

Kontraindicerat till barn under 3 år.

ADMINISTRERING

En droppe med den medföljande pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin.
1 droppe = 1 mg = 0,025 mL
Doser mindre än 1 droppe går ej att administrera.

Alimemazin orala droppar kan i samband med administrering spädas med lämplig dryck, ex. juice eller saft. Bör inte samadministreras med mjölk/mjölkprodukter då ett hjälpämne i dropparna reagerar med mjölk och det bildas en fällning.

Oralt

Enteralt: Dropparna är trögflytande men kan spädas med lika del vatten före administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Alimemazin (registrerad produkt)

40 mg/mL, Orala droppar, lösning

Orifarm: Förvaras vid högst 30 °C. Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen.
Evolan: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning är hållbar i 3 månader.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

1 droppe = 1 mg = 0,025 mL

Ångest (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov. Max 30 mg/DYGN.

Oro (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 3 - 10 mg/DYGN (3 - 10 droppar/DYGN)

Barn 6 - 12 år: 3 - 15 mg/DYGN (3 - 15 droppar/DYGN)

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en större deldos ges på kvällen.

Sömnrubning (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 2 - 7 mg (2 - 7 droppar)

Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg (5 - 10 droppar)

Dosen ges till natten.

Klåda och allergi (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 3 - 10 mg/DYGN (3 - 10 droppar/DYGN)

barn 6 - 12 år: 3 - 15 mg/DYGN (3 - 15 droppar/DYGN)

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en större deldos ges på kvällen.





Alimemazin oralt 40 mg/mL

(fd Theralen) orala droppar

ÖVRIG INFORMATION

Bör ej ges till barn under 3 år pga risk för en uttalad sederande effekt och andningsdepression.

Överdoserings kan leda till allvarlig intoxikation. Effekterna potentiernas av andra centraldämpande substanser samt av alkohol. Överväg riskerna och förskriv minsta möjliga mängd. Beakta extra stor försiktighet vid förskrivning av alimemazin oral lösning då flaskan innehåller en dos om 2000 mg i en liten volym.

Alimemazin kan i undantagsfall användas även vid sedering på intensivvårdsavdelning och då förekommer högre doser.

För alimemazin orala droppar finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för alimemazin.

Fentiaziner och fentiazinliknande preparat som till exempel alimemazin har problem med hang over-effekt med kvarstående sedering, men även andra risker som till exempel förlängd QT-tid med risk för ventrikelflimmer vid överdos, samt motoriska och centralnervösa biverkningar. Alimemazin saknar indikation för sömnstörningar hos barn och rekommenderas inte.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas. Särskilt aripiprazol då plasmakoncentrationen av aripiprazol kan öka med 50 % och behöva dosjusteras.



Alimemazin oralt 40 mg/mL

(fd Theralen) orala droppar



REFERENS/LÄNK

Artikel Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2021/09/sedativa-antihistaminer-risk-for-allvarlig-intoxikation/>

Artikel Slørdal L et al. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn?

<https://tidsskriftet.no/2008/10/legemidler-i-praksis/er-alimemazin-et-egnet-sovnmiddel-barn>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

www.lakemedelsverket.se/somnstorning

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

PubMed PMID Holdø I et al, Association between prescribing hypnotics for parents and children in Norway. 2013

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23845695>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3104

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-10-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT