

Alimemazin (Theralen) PO orala droppar 40 mg/mL

Alimemazine

Administreringsätt

Oralt: En droppe med den medföljande pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin.
Doser mindre än 1 droppe går ej att administrera.

Vanlig indikation och dos

Neo: Oro

0,3 (- 0,5) mg/kg x 2-3.

Tillägg vid sedering (BIVA)

2 - 4 mg/kg

Rimlig dos för barn

0,3 droppar/kg/dos

0,5 droppar/kg/dos

1 kg**5 kg****10 kg****50 kg**

Övrig information

Bristande dokumentation för barn under 2 år då säkerheten vid behandling ej fastställts.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2015-04-17

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sedering vid intensivvård av barn (BIVA), Hämtat: 2015-04-17

<http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID03665412753B49D4C1257BE2001CBFCF?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-04-21

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-04-17 09:28:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-21 11:25:39

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3104

ID/spårnummer: 652

Giltig fr o m: 2015-04-21 11:25:39

Utskriftsdatum: 2015-04-21

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

