

Alimemazin oralt 40 mg/mL

(Theralen)

Bör ej ges till barn under 2 år

Administreringsätt

Oralt: En droppe med den medföljande pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin. Doser mindre än 1 droppe går ej att administrera.

Vanlig indikation och dos

Sömnrubbing (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 2 – 5 år: 2,5 – 7,5 mg

Barn 5 – 12 år: 5 – 10 mg

Dosen ges till natten

Hållbarhet preparat:

Theralen (registrerad produkt)

● 40 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt

Övrig information

Bör ej ges till barn under 2 år pga risk för en uttalad sederande effekt och andningsdepression.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

Internetadress Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn

<https://lakemedelsverket.se/somnstorningarhosbarn>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Alimemazine, R06AD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POBZU95MDVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-19 16:35:01

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-21 08:52:25

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3104

ID/spårnummer: 3407

Giltig fr o m: 2017-06-21 08:52:25

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

