

# Klonazepam oralt 2,5 mg/mL

(Iktorivil), orala droppar

Innehåller propylenglykol, mer information under Övrigt.

Om svagare styrka behövs kan injektionsvätskan ges oralt. Ny ordination krävs.

## Administreringsätt

Oralt: Ges med sked. Kan blandas med vatten, juice eller annan dryck.  
Enteralt i sond

## Vanlig indikation och dos

### Kramper, epilepsi

Initial dos:

1 mån - 18 år: 0,05 mg/kg/dygn (50 mikrogram/kg/dygn), max 1 mg/dygn.

Dygnsdosen ska delas upp på 3 - 4 doseringstillfällen vilket motsvarar:

0,0125 mg/kg x 4 (12,5 mikrogram/kg x 4) eller

0,0167 mg/kg x 3 (16,7 mikrogram/kg x 3)

Vanlig underhållsdos:

Under 1 år: 0,5 - 1 mg/dygn (5 - 10 droppar/dygn)

1 - 5 år: 1,5 - 3 mg/dygn (15 - 30 droppar/dygn)

6 - 16 år: 3 - 6 mg/dygn (30 - 60 droppar/dygn)

Över 16 år: 4 - 8 mg/dygn (40 - 80 droppar/dygn)

Dygnsdosen ska delas upp på 3 - 4 doseringstillfällen.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,0125 mg/kg			0,05 mL	0,25 mL
0,0167 mg/kg			0,07 mL	0,33 mL

## Hållbarhet preparat:

Klonazepam (registrerad produkt)

● 2,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

## Övrig information

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-08 09:51:02

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-14 13:20:38

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3105

ID/spårnummer: 2985

Giltig fr o m: 2017-03-14 13:20:38

Utskriftsdatum: 2017-03-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil), orala droppar

bronkiell hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

1 droppe = 0,1 mg klonazepam = 0,04 mL

Dropparna innehåller 1018,3 mg propylenglykol per mL. Detta motsvarar propylenglykol/dos:

0,0167 mg/kg klonazepam = 6,8 mg/kg propylenglykol

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten anger följande gränsvärden (maximal daglig dos som hjälpämne i läkemedel) för propylenglykol:

Nyfödda upp till 28 dagar: 1 mg/kg

Prematurt nyfödda upp till 44 veckor postmenstruell ålder: 1 mg/kg

Barn 1 mån - 4 år: 50 mg/kg

Barn 5 - 18 år: 500 mg/kg

---

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

European Medicines Agency (EMA) Background review for the excipient propylene glycol

[http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Report/2014/12/WC500177937.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/12/WC500177937.pdf)

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### Substansspecifika uppgifter

Clonazepam, N03AE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POCOU90K6VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-08 09:51:02  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-14 13:20:38  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3105  
ID/spårnummer: 2985  
Giltig fr o m: 2017-03-14 13:20:38  
Utskriftsdatum: 2017-03-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

