

Klonazepam oralt 2,5 mg/mL

(Iktorivil) orala droppar

Instruktionen gäller för: Iktorivil orala droppar 2,5 mg/mL

Beredningsinstruktion: 1 droppe = 0,1 mg klonazepam = 0,04 mL

Administreringssätt

Håll flaskan helt upp och ner. Droppa inte direkt i patientens mun utan ge med sked eller liknande. Dropparna kan blandas med vatten, juice eller annan dryck.

Oralt

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Börja med låg dos, förslagvis 0,01 - 0,02 mg/kg/dygn, max 1 mg/dygn.

Titra sedan upp till lägsta möjliga effektiva dos för att undvika biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 0,05 mg/kg/dygn

Dygnsdosen ska delas upp på 2 - 4 doseringstillfällen.

Exempel på doser per tillfälle:

0,01 mg/kg/dygn = 0,0025 mg/kg x 4 eller 0,0033 mg/kg x 3

0,05 mg/kg/dygn = 0,0125 mg/kg x 4 eller 0,0167 mg/kg x 3

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,0025 mg/kg				0,05 mL
0,0033 mg/kg				0,07 mL
0,0125 mg/kg			0,05 mL	0,25 mL
0,0167 mg/kg			0,07 mL	0,33 mL

Hållbarhet preparat:

Klonazepam (registrerad produkt)

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-23 15:50:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-24 15:02:25

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3105

ID/spårnummer: 4225

Giltig fr o m: 2018-01-24 15:02:25

Utskriftsdatum: 2018-01-24

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klonazepam oralt 2,5 mg/mL

(Iktorivil) orala droppar

- 2,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån. Förvaras i rumstemperatur.

Övrig information

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller bronkiell hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

Erfarenhetsmässigt är doseringen för klonazepam i FASS väl hög och medför större risk för biverkningar.

Om svagare styrka behövs kan injektionsvätskan ges oralt. Ny ordination krävs.

Dropparna innehåller 1018,3 mg propylenglykol per mL. Detta motsvarar propylenglykol/dos:

0,0167 mg/kg klonazepam = 6,8 mg/kg propylenglykol

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten anger följande gränsvärden (maximal daglig dos som hjälpämne i läkemedel) för propylenglykol:

Nyfödda upp till 28 dagar: 1 mg/kg

Prematurt nyfödda upp till 44 veckor postmenstruell ålder: 1 mg/kg

Barn 1 mån - 4 år: 50 mg/kg

Barn 5 - 18 år: 500 mg/kg

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnf/current/>

European Medicines Agency (EMA) Background review for the excipient propylene glycol

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/12/WC500177937.pdf

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Clonazepam, N03AE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCOU90K6VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-23 15:50:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-24 15:02:25

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3105

ID/spårnummer: 4225

Giltig fr o m: 2018-01-24 15:02:25

Utskriftsdatum: 2018-01-24

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

