



# Klonazepam oralt 2,5 mg/mL

(Iktorivil) orala droppar

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Iktorivil orala droppar 2,5 mg/mL

### Beredningsinstruktion:

1 droppe = 0,1 mg klonazepam = 0,04 mL

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Håll flaskan helt upp och ner. Droppa inte direkt i patientens mun utan ge med sked eller liknande. Dropparna kan blandas med vatten, juice eller annan dryck.

Oralt

Enteralt i sond

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Klonazepam (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån. Förvaras i rumstemperatur.

## ÖVRIG INFORMATION

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller bronkiell hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

Erfarenhetsmässigt är doseringen för klonazepam i FASS väl hög och medför större risk för biverkningar.

Om svagare styrka behövs kan injektionsvätskan ges oralt. Ny ordination krävs.

Dropparna innehåller 1018,3 mg propylenglykol per mL. Detta motsvarar propylenglykol/dos:

0,0167 mg/kg klonazepam = 6,8 mg/kg propylenglykol

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten anger följande gränsvärden (maximal daglig dos som hjälpämne i läkemedel) för propylenglykol:

Nyfödda upp till 28 dagar: 1 mg/kg

Prematurt nyfödda upp till 44 veckor postmenstruell ålder: 1 mg/kg

Barn 1 mån - 4 år: 50 mg/kg

Barn 5 - 18 år: 500 mg/kg

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Börja med låg dos, förslagvis 0,01 - 0,02 mg/kg/dygn, max 1 mg/dygn.

Titra sedan upp till lägsta möjliga effektiva dos för att undvika biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 0,05 mg/kg/dygn

Dygnsdosen ska delas upp på 2 - 4 doseringstillfällen.

Exempel på doser per tillfälle:

0,01 mg/kg/dygn = 0,005 mg/kg x 2 eller 0,0033 mg/kg x 3

0,05 mg/kg/dygn = 0,025 mg/kg x 2 eller 0,0167 mg/kg x 3

## RIMLIG DOS FÖR 2,5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,0033 mg/kg	-	-	-	0,07 mL
0,005 mg/kg	-	0,01 mL	0,02 mL	0,1 mL
0,0167 mg/kg	-	-	0,07 mL	0,33 mL
0,025 mg/kg	-	0,05 mL	0,1 mL	0,5 mL

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

European Medicines Agency (EMA) Background review for the excipient propylene glycol

[http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Report/2014/12/WC500177937.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/12/WC500177937.pdf)

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-02-13 16:42:13

ePedID: 3105

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-14 09:58:58

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-02-14 09:58:58

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT