



## Medicinskt kol oralt

(Carbomix) oral suspension

### EN-STEGSSPÄDNING

Carbomix		Vatten (från kran)		ORAL SUSP
25 g	+		=	<b>0,17 g/mL</b>
1 st		150 mL		150 mL

#### Beredningsinstruktion:

Fyll flaskan med vatten till det röda fältet i etikettens överkant, ca 150 mL. Tillslut korken ordentligt och skaka flaskan väl i ca en minut. Öppna flaskan försiktigt.

### EN-STEGSSPÄDNING

Carbomix		Vatten (från kran)		ORAL SUSP
50 g	+		=	<b>0,17 g/mL</b>
1 st		300 mL		300 mL

#### Beredningsinstruktion:

Fyll flaskan med vatten till det röda fältet i etikettens överkant, ca 300 mL. Tillslut korken ordentligt och skaka flaskan väl i ca en minut. Öppna flaskan försiktigt.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: till små barn kan pipmugg underlätta administrering.

Enteralt i sond: för sondanslutning klipps toppen på "munstycket" av.

Kol kan vara enklare att administrera via sond än peroralt, varför man kan passa på att ge det via sonden efter ev. avslutad ventrikelsköljning.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Carbomix (registrerad produkt)

0,17 g/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Färdigblandad suspension är hållbar 1 vecka. Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C).

25 g, Granulat till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även 50 g.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling sker i samråd med Giftinformationscentralen, tel: 010-456 67 19.

#### Akuta förgiftningar

Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd.

Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10.

Kol bör inte ges före tillförsel av kräksirap, och inte heller om en specifik antidot ska ges peroralt.

Barn 1 mån - 12 år: 10 g initialt (motsvarande ca 60 mL Carbomix)

Barn 13 - 18 år: 25 g initialt (motsvarande ca 150 mL Carbomix)

Vid allvarlig förgiftning ges den dubbla dosen eller mer på sjukhus.

### ÖVRIG INFORMATION

Aktivt kol adsorberar ett stort antal läkemedel vilkas absorption därför minskar. Carbomix och andra läkemedel bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress Giftinformationscentralen Giftinfo för läkare Medicinskt kol  
<https://giftinformation.se/lakare/initiala-atgarder/medicinskt-kol/>

PubMed PMID Cochrane Syst Rev Chiew et al Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdose  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29473717>

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-12-06

ePedID: 3111

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-11

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-12-11

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**