

Snabb uppvätskning, 4 h, PO i sond

Rekommendation:

Barn under 6 månader uppvätskas i första hand med egen mammas bröstmjolk, om det inte räcker ges tillägg av BabySemp.

Barn över 6 månader uppvätskas framför allt med majsavalling alternativt Nutramigen vid allergi. Kan vid behov blandas med vätskeersättning.

Administrerings sätt

Enteralt i sond: Barn: uppvätskning ges under 4 timmar.

Vanlig indikation

Sonduppvätskning vid dehydrering hos barn med infektiös gastroenterit.

Vanlig dosering

5% av barnets kroppsvikt ges under 4 timmar.

Ex: 13 kg barn: $0,05 \times 13 \text{ kg} = 0,65 \text{ kg}$ vilket antas motsvara 0,65 liter = 650 ml

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Rehydrering med nasogastrisk sond, Hämtat: 2014-03-21

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/b020946a13d16d71c1257a310043e7c1?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-03-27 16:14:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-03-27 16:25:50

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3128

ID/spårnummer: 258

Giltig fr o m: 2014-03-27 16:25:50

Utskriftsdatum: 2014-03-27

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

