



Uppvätskning: Snabb 4 h, enteralt i sond

(Semper Vätskeersättning)

EN-STEGSSPÄDNING

Vätskeersättning (påse)	Vatten (från kran)		ORAL LÖSN
			1 st
1 st	+	2,5 dL	=
			2,5 dL

Beredningsinstruktion:

Vispa ner innehållet från 1 påse i 2,5 dL kallt vatten.

EN-STEGSSPÄDNING

Vätskeersättning (påse)	Vatten (från kran)		ORAL LÖSN
			1 st
4 st	+	1 L	=
			1 L

Beredningsinstruktion:

Vispa ner innehållet från 4 påsar i 1 liter kallt vatten.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Enteralt i sond: uppvätskning ges under 4 timmar.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Vätskeersättning (påse) (livsmedel)

1 st, Oral lösning

HÅLLBAR: Färdigblandad lösning förvaras 6 tim i kylskåp alternativt 4 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sonduppvätskning vid dehydrering hos barn med infektiös gastroenterit

5 % av barnets kroppsvikt ges under 4 timmar.

Ex: 13 kg barn: $0,05 \times 13 \text{ kg} = 0,65 \text{ kg}$ vilket antas motsvara 0,65 liter/4 timmar = 650 mL/4 timmar = 162,5 mL/timme

REFERENS/LÄNK

Internetadress Produktinformation Vätskeersättning, Semper

<https://www.semperbarnmat.se/produkter/vatskersattning>

Rekommendation ,(Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3128

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-10-23

ePedID: 3128

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-30

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT