



Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Avdödat konjugerat pneumokockvaccin med 13 olika serotyper (PCV13)

Förfylld spruta 0,5 mL, ska ej spädas

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion:

Sprutan ska omskakas väl innan den töms på luft. Vaccinet ska vara en vit homogen suspension. Se Övrig information.

Barn under 1 år: Ges i anterolaterala delen av låret.

Barn från 1 år: Ges i deltoideus.

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prevenar 13 (registrerad produkt)

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Kan förvaras i rumstemperatur i 4 dygn, inom denna tid ska vaccinet användas eller kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Även prematurfödda barn följer det ordinarie vaccinationsprogrammet.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 3 mån ålder (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 2: vid 5 mån ålder (minst 6 v efter dos 1)

Dos 3: vid 12 mån ålder (minst 6 mån efter dos 2)

ÖVRIG INFORMATION

För barn som inte har följt det allmänna vaccinationsprogrammet ska vaccination mot pneumokocker erbjudas barn upp till 6 års ålder. Se dosering i produktresumé.

För vaccination av barn i riskgrupper, se referens Folkhälsomyndigheten eller lokala riktlinjer.

Det finns två konjugatvacciner mot pneumokocker; Synflorix (10 serotyper, PCV10) respektive Prevenar 13 (13 serotyper, PCV13). Prevenar 13 är för närvarande det enda som är godkänt för användning till personer från 6 års ålder.

Barnhälsovården rekommenderar att varje barn får de två första doserna (primärdoserna) med samma vaccin, vid booster dosen (12 mån) kan byte ske. Vid brist på ett vaccin ska inte en dos fördröjas utan då kan byte göras redan vid dos 2.

Pneumovax är ett polysackaridvaccin mot pneumokocker med 23 serotyper (PPV23). Det kan ges till vuxna och barn över 2 års ålder och används ofta som komplement till konjugatvaccin.

Under förvaringen av vaccinet kan det bildas en vit fällning med en klar vätska ovanpå. Detta påverkar inte vaccinets effekt, men sprutan ska skakas innan administrering för att en homogen suspension ska erhållas.





Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsöversikt-for-halsovardspersonal/>

Internetadress SKL - Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för vaccinationer angående övergång mellan olika vacciner i samband med nationell vaccinupphandling 2018 och 2019

<https://www.skllkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/vaccin-enligt-nationella-barnvaccinprogrammet-2018/rekommendationer-fran-barnhalsovardens-nationella-arbetsgrupp-for-vaccin....pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3134

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-10-08

ePedID: 3134

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-15

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT