

Cancidas, IV inf (Obs 2 steg)

Caspofungin 0,4 mg/ml

enl spädn-schema

Alla nedanstående alternativ ger Caspofungin 0,4 mg/ml (Obs 2 steg). Välj lämplig slutvolym och iordningställ enligt instruktionerna

Alt 1. 50 mg Cancidas till 0,4 mg/ml (Obs 2 steg)

	<i>inf subst</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	pulver		sterilt vatten	5 mg/ml
	50 mg	+	10,8 ml	= 10,8 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
steg 2	5 mg/ml		NaCl 9 mg/ml	0,4 mg/ml
	10 ml	+	115 ml	= 125 ml

Alt 2. 70 mg Cancidas till 0,4 mg/ml (Obs 2 steg)

	<i>inf subst</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	pulver		sterilt vatten	7 mg/ml
	70 mg	+	10,8 ml	= 10,8 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
steg 2	7 mg/ml		NaCl 9 mg/ml	0,4 mg/ml
	10 ml	+	165 ml	= 175 ml

Beredningsinstruktion: Får inte beredas med glukos.

För att lösa upp pulvret, låt injektionsflaskan anta rumstemperatur och tillsätt aseptiskt 10,8 ml vatten för injektionsvätskor.

Då injektionsflaskan är överfylld med pulver krävs 10,8 ml sterilt vatten i steg 1.

Administrering: Infunderas intravenöst under 1 timme

Hållbarhet efter iordningställande: Stamlösning får INTE sparas pga förväxlingsrisk.

12 h rumstemperatur, 24 h kyl för spädd infusionslösning.; Originalförp hållbarhet: Förvaras i kylskåp.

Cancidas, IV inf (Obs 2 steg)

Caspofungin 0,4 mg/ml

enl spädn-schema

Varunummer: 6115, Cancidas pu inf lö 50mg, 10 ml

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt lokala läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Invasiva mykoser inkl. aspergillos

Vanlig dos: Barn 1 - 17 år: Laddningsdos 70 mg/kvm dag 1, därefter 50 mg/kvm/dygn givet som en dos per dygn.

Maxdos 70 mg/dygn.

Kommentar: Obs! Denna spädningsinstruktion skiljer sig något från den i FASS.

Varje ampull med 50 resp. 70 mg innehåller med avsikt mer pulver än 50 resp. 70 mg för att kunna ge den dos som står på flaskan då man tar 10 ml upplöst stamlösning.
