

## Caspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Cancidas)

NATRIUMKLORID 9 mg/mL ska användas för spädning samt spolning före och efter infusionen.

Färdigberedd lösning kan beställas från apoteket.

### Två-stegsspädning

FRÅN 50 MG

#### steg1

Cancidas		Sterilt Vatten	=	Stamlösning
50 mg	+			5 mg/mL
1 st		10,8 mL		10,8 mL

#### steg2

Stamlösning		NaCl 9 mg/mL	=	INF
5 mg/mL	+			<b>0,4 mg/mL</b>
4 mL		46 mL		50 mL

### Två-stegsspädning

FRÅN 70 MG

#### steg1

Cancidas		Sterilt Vatten	=	Stamlösning
70 mg	+			7 mg/mL
1 st		10,8 mL		10,8 mL

#### steg2

Stamlösning		NaCl 9 mg/mL	=	INF
7 mg/mL	+			<b>0,4 mg/mL</b>
10 mL		165 mL		175 mL

Beredningsinstruktion: För att lösa upp pulvret, låt injektionsflaskan anta rumstemperatur och tillsätt 10,8 mL sterilt vatten. Blanda försiktigt tills en klar lösning erhålls. Använd inte lösningen om den är grumlig eller har en fällning.

Då injektionsflaskan är överfylld med pulver krävs 10,8 mL sterilt vatten i steg 1.

Får INTE beredas med glukos då caspofungin inte är stabilt i sådan lösning.

### Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Skyddsinformation saknas i FASS

### Administreringssätt

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-20 16:30:52  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-22 13:36:21  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3164  
ID/spårnummer: 3426  
Giltig fr o m: 2017-06-22 13:36:21  
Utskriftsdatum: 2017-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Caspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL

## (ex Cancidas)

Intravenös infusion: Ges under 60 minuter.

### Vanlig indikation och dos

**Invasiva mykoser inkl. aspergillos samt empirisk behandling av trolig svampinfektion hos neutropena patienter med feber**

Nyfödda: 25 mg/m<sup>2</sup> x 1

Barn 1 - 2 mån: 25 mg/m<sup>2</sup> x 1

Barn 3 - 11 mån: 50 mg/m<sup>2</sup> x 1

Barn 1 - 18 år:

Laddningsdos dag 1: 70 mg/m<sup>2</sup>, max 70 mg

Därefter 50 mg/m<sup>2</sup> x 1, max 70 mg/dos. Kan ökas till 70 mg/m<sup>2</sup> x 1, max 70 mg/dos.

Behandlingstid:

Invasiv aspergillos: minst 7 dagar efter tillbakagång av symtomen, ca 6 - 12 veckor

Invasiv candidiasis: minst 14 dagar efter sista positiva odling

Empirisk behandling: 72 timmar efter att neutropenin upphört. Vid påvisad svampinfektion minst 14 dagars behandling och behandlingen bör fortsätta minst 7 dagar efter att neutropenin och symtom upphört.

### Hållbarhet preparat:

Cancidas (registrerad produkt)

- 50 mg, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C), gäller både 50 mg och 70 mg.

- 5 mg/mL, Stamlösning

Hållbar: Stamlösning får INTE sparas pga förväxlingsrisk, gäller både stamlösning 5 mg/mL och 7 mg/mL.

- 0,4 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

### Övrig information

OBS Denna spädningsinstruktion skiljer sig något från den i FASS. Varje ampull innehåller med avsikt mer pulver än 50 resp. 70 mg för att kunna ge den dos som står på flaskan då man tar 10 mL upplöst stamlösning. Av den anledningen behövs 10,8 mL sterilt vatten för att koncentrationen ska bli 5 mg/mL.

### Referens/Länk

BNF-C

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-20 16:30:52

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-22 13:36:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3164

ID/spårnummer: 3426

Giltig fr o m: 2017-06-22 13:36:21

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Caspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Cancidas)

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/.htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

## Substansspecifika uppgifter

casprofungin, J02AX04

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POJPUCJ59VERT1&UserTypeD=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-20 16:30:52  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-22 13:36:21  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3164  
ID/spårnummer: 3426  
Giltig fr o m: 2017-06-22 13:36:21  
Utskriftsdatum: 2017-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

