



## Budesonid oralt 3 mg

(Entocort, Budenofalk)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depotkapsel 3 mg (Entocort)  
Enterokapsel 3 mg (Budenofalk)

### ADMINISTRERING

Oralt:  
Depotkapslarna sväljes hela och ska tas på morgonen.

Vid sväljsvårigheter kan depotkapseln öppnas och innehållet blandas i vatten, eller annan dryck med pH under 5,5 som t.ex. äppeljuice eller apelsinjuice, för omedelbar administrering. Kornen får inte tuggas eller krossas.

Enterokapslarna ska sväljas hela och intas på morgonen eller uppdelat på tre dostillfällen. Kapslarna tas ca 30 min innan måltid.

Enteralt:  
Depotkapselns innehåll kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Budesonid (registrerad produkt)

- 3 mg, Depotkapsel, hård  
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i rumstemperatur.
- 3 mg, Enterokapsel, hård  
Förvaras i rumstemperatur.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Aktiv, mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och colon ascendens

Depotkapsel, barn från 8 år:  
3 - 9 mg x 1 på morgonen under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

Enterokapsel, barn från 8 år:  
3 - 9 mg, fördelat på 1 - 3 doseringstillfällen per dygn under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

Vid feber, påfrestningar och andra stressituationer kan dosen behöva höjas, alternativt kan ett tillägg av systemisk glukokortikosteroid ges.

Det finns ingen erfarenhet från behandling längre än 12 veckor.

### ÖVRIG INFORMATION

Budesonid kan hämma tillväxt hos barn och ungdomar. Kontroll av längdtillväxt rekommenderas.

Nedsatt leverfunktion leder till att den systemiska biotillgängligheten ökar för budesonid.

Försiktighet bör iaktas vid behandling av patienter med infektioner, diabetes mellitus, magsår, osteoporos, hypertension, glaukom eller katarakt samt patienter med arvet för diabetes eller glaukom.

Mässling och vattkoppor kan få ett förvärrat förlopp hos en patient som behandlas med orala glukokortikosteroider, försiktighet bör iaktas så att patienten inte smittas av dessa sjukdomar under behandlingens gång.



## Budesonid oralt 3 mg

(Entocort, Budenofalk)



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, sektion för barnreumatologi.  
Farmakologisk behandling av JIA

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/Farmakologisk-beh-JIA-2019-05-31b.pdf>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Micromedex

PubMed PMID Escher JC; European Collaborative Research Group on Budesonide in Paediatric IBD. Budesonide versus prednisolone for the treatment of active Crohn's disease in children: a randomized, double-blind, controlled, multicentre trial. Eur J Gastroenterol Hepato

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095852>

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3177

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-08-24

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**