



Ondansetron oralt

(ex Zofran) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 4 och 8 mg (ex Zofran)
Munsönderfallande tabletter 4 och 8 mg (ex Zofran)

Till små barn och administrering via sond rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: För att underlätta nedsväljning kan tabletterna delas. Eventuell brytskåra är inte avsedd för att ge halva dosen, eftersom dosgrannheten då inte kan säkerställas. Vid behov av lägre dos rekommenderas istället oral lösning, se annan instruktion.

Enteralt i sond: Oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.
Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.
Munsönderfallande tablett kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.

Ondansetron bör administreras 30 min före kemoterapi eller 1 - 2 timmar före strålbehandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ondansetron (ex Zofran) (registrerad produkt)

4 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor och tillverkare.

4 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Gäller samtliga styrkor och tillverkare.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Illamående vid cytostatikabehandling

Barn: 1 mån - 18 år:
Låg emetogen risk
10 mg/m² x 1, max 16 mg/dygn
Alternativ dosering:
0,3 mg/kg x 1, max 16 mg/dygn

Medelhög emetogen risk
5 mg/m² x 2, max 8 mg/DOS, max 16 mg/dygn
Alternativ dosering:
0,15 mg/kg x 2, max 8 mg/DOS, max 16 mg/dygn

Hög emetogen risk
5 mg/m² x 3
Alternativ dosering:
0,15 mg/kg x 3

Allvarliga kräkningar vid gastroenterit

Barn 6 mån - 18 år:
8 - 15 kg: 2 mg
16 - 30 kg: 4 mg
Över 30 kg: 8 mg

Engångsdos anses tillräckligt, men vid behov kan dosen upprepas 3 gånger/dygn.

Rehydrering med peroral vätskeersättning påbörjas 15 - 30 minuter efter intag av ondansetron.





Ondansetron oralt

(ex Zofran) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebyggande och behandling av postoperativt illamående

I första hand rekommenderas intravenös administrering.

Barn: 5 - 18 år: 0,15 mg/kg, max 8 mg/DOS (låg evidens)

Dos ska ges precis innan anestesi för förebyggande behandling eller vid symptom. Vanligtvis har upprepad dosering ingen ytterligare effekt.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen Ondansetron minskar kräkningar hos barn med akut gastroenterit. Bergemalm J 2018

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2018/02/ondansetron-minskar-krakningar-hos-barn-med-akut-gastroenterit/>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Efficacy, safety and feasibility of fosaprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric patients receiving moderately and highly emetogenic chemotherapy – results of a noninterventional observation study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6858739/pdf/12885_2019_Article_6252.pdf

PubMed PMID Emergency department use of oral ondansetron for acute gastroenteritis-related vomiting in infants and children

<https://www.cps.ca/en/documents/position/oral-ondansetron>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Profylax mot illamående och kräkningar (CINV-profylax)

<https://pho.barnlakarforeningen.se/varprogram-pho/>



Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2021-01-26

ePedID: 3192

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-01-26

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-01-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT