

Pamidronat intravenös inf 0,1 mg/mL

(ex Pamifos, f.d Aredia) nyfödda

Instruktionen gäller för: Spädning från ex Pamifos och Pamidronatdintrium Hospira koncentrat 3 mg/mL till 0,1 mg/mL.

En-stegsspädning:	Pamidronat (ex Hospira)	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9	INF
	3 mg/mL	mg/mL	0,1 mg/mL
	1 mL	29 mL	30 mL

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt

Intravenös infusion: långsamt under 4 timmar, max 1 mg/min.

Patienten måste vara väl uppvätskad innan behandling.

Vanlig indikation och dos

"Generalized arterial calcification of infancy", GACI

Nyfödda: Initialt 0,1 - 0,25 mg/kg/vecka.

I vissa studier pågick behandlingen 3 - 4 veckor. Begränsad vetenskaplig evidens.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg/vecka	1 mL	5 mL		
0,25 mg/kg/vecka	2,5 mL	12,5 mL		

Hållbarhet preparat:

Pamidronat (ex Hospira) (registrerad produkt)

● 0,1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar: 12 tim rumstemperatur, 24 tim kylskåp.

Övrig information

Får inte ges med kalciuminnehållande vätskor.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-17 15:44:42

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 10:26:06

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3203

ID/spårnummer: 3639

Giltig fr o m: 2017-09-05 10:26:06

Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Pamidronat intravenös inf 0,1 mg/mL (ex Pamifos, f.d Aredia) nyfödda

Osteonekros i käken har rapporterats hos patienter med cancer som får cytostatika och samtidigt behandlats med intravenöst pamidronat.

Pamidronat kan vara njurtoxiskt och därför är det viktigt att följa rekommenderad infusionstid och inte överstiga dosen 90 mg.

Saltformen av den aktiva substansen i dessa produkter namnges på olika sätt pamidronatdinatrium och dinatriumpamidronat men skiljer sig inte i effekt.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Edouard T et al. Efficacy and safety of 2-year etidronate treatment in a child with generalized arterial calcification of infancy.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21932012>

PubMed PMID Ramjan KA et al. Generalized arterial calcification of infancy: treatment with bisphosphonates.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19229237>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Pamidronic acid, M05BA03

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POEZUALTOVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-08-17 15:44:42
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 10:26:06
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3203
ID/spårnummer: 3639
Giltig fr o m: 2017-09-05 10:26:06
Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

