

# Serum mot huggormsgift intravenös inf

## (ViperaTAb licens) får

Vid osäkerhet eller behov av ytterligare info, ring Giftinformationscentralen (GIC) 08-736 03 84.

### Tillsatser som ger Serum mot huggormsgift intravenös inf

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Fårserum mot huggormsgift 100 mg IV | 2 st   |
| Natriumklorid 9 mg/mL IV            | 100 mL |

Beredningsinstruktion: 2 st ampuller späds i 100 mL NaCl 9 mg/mL. 1 ampull innehåller 4 mL koncentrat (motsvarande 100 mg antigenbindande fragment).

Hela volymen ska ges till patienten oavsett ålder och vikt.

### Administreringsätt

Intravenös infusion: 30 minuter.

### Vanlig indikation och dos

#### Huggormsbett, serumbehandling

Barn: 200 mg x 1

Motsvarar 2 st ampuller á 100 mg antigenbindande fragment.

Dosen upprepas vid behov om allvarliga symtom återkommer efter initial förbättring av dos 1 eller om utebliven förbättring av dos 1 inom 2 timmar.

Ring GIC för diskussion om indikation för en andra dos.

För mer information kontakta GIC och/eller se lokalt PM.

### Hållbarhet preparat:

Fårserum mot huggormsgift (licensprodukt)

● 100 mg, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C)

### Övrig information

Barn bör observeras i minst 24 timmar efter inkomst till sjukhus då reaktionerna efter huggormsbett kan variera kraftigt. Tecken på systempåverkan uppkommer i allmänhet under de närmaste timmarna efter bettet. Naturalförloppet för

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-03-22 11:52:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-19 14:31:00

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3204

ID/spårnummer: 3137

Giltig fr o m: 2017-04-19 14:31:00

Utskriftsdatum: 2017-04-24

Kontrollera alltid att utskrivna kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) får

maximal utbredning av lokalreaktionen är 48 - 72 timmar.

Vid serumtillförel minskar allmänsymtomen snabbt. Cirkulationspåverkan viker inom 1 timme och GI-symtom inom 2 timmar. Tidig tillförel av serum är det enda som effektivt kan påverka lokalreaktionens utbredning.

Allergiska reaktioner har hittills ej förekommit efter administrering av detta preparat.

---

### Referens/Länk

Internetadress Giftinformationscentralen, Huggormsbett

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/huggorm/>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) ViperaTAb

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3204](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3204)

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-03-22 11:52:59  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-19 14:31:00  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3204  
ID/spårnummer: 3137  
Giltig fr o m: 2017-04-19 14:31:00  
Utskriftsdatum: 2017-04-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

