



Serum mot huggormsgift intravenös inf

(ViperaTAB licens) fårserum

**Kontakt med Giftinformationscentralen (GIC) 010 - 456 67 00,
www.giftinformation.se/lakare rekommenderas.**

Tillsatser som ger Serum mot huggormsgift intravenös inf

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Fårserum mot huggormsgift 100 mg IV | 2 st |
| Natriumklorid 9 mg/mL IV | 100 mL |

Beredningsinstruktion:

Innehållet från 2 st injektionsflaskor tillsätts till 100 mL NaCl 9 mg/mL.
1 injektionsflaska innehåller 4 mL koncentrat (motsvarande 100 mg antigenbindande fragment).

Hela volymen ska ges till patienten oavsett ålder och vikt.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: 30 minuter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Huggormsbett

Behandling ska ges så tidigt som möjligt vid allvarliga symtom; vid snabb progress av lokalreaktionen, alla typer av allmänpåverkan som inte snabbt går i regress eller som återkommer.

Barn 1 mån - 18 år: 200 mg x 1 (2 st injektionsflaskor)

Vid behov kan dosen upprepas om allvarliga symtom återkommer efter initial förbättring av dos 1 eller om utebliven förbättring av dos 1 inom 2 timmar.

Ring GIC för diskussion om indikation och för mer information.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Giftinformationscentralen - Antidotregistret

<https://giftinformation.se/Antidot>

Internetadress Giftinformationscentralen - Huggormsbett

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/huggorm/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) ViperaTAB

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3204

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-10-04

ePedID: 3204

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-10-17

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Serum mot huggormsgift intravenös inf

(ViperaTAb licens) fårserum

ÖVRIG INFORMATION

Alla huggormsbitna barn bör bedömas på sjukhus.

Barn bör observeras i minst 24 timmar efter ankomst till sjukhus då reaktionerna efter huggormsbett kan variera kraftigt. Tecken på systempåverkan uppkommer i allmänhet under de närmaste timmarna efter bettet. Naturalförloppet för maximal utbredning av lokalreaktionen är 48 - 72 timmar.

Vid serumtillförsel minskar allmänsymtomen snabbt. Cirkulationspåverkan viker inom 1 timme och GI-symtom inom 2 timmar. Tidig tillförsel av serum är det enda som effektivt kan påverka lokalreaktionens utbredning.

Allergiska reaktioner har hittills ej förekommit efter administrering av detta preparat.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fårserum mot huggormsgift (licensprodukt)

100 mg, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C)

200 mg, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, hela volymen ges till patienten direkt efter beredning.