



Serum mot huggormsgift intravenös inf

(ViperaTAb licens) fårserum

**Kontakt med Giftinformationscentralen (GIC) 010 - 456 67 19 (för sjukvården),
www.giftinfo.se rekommenderas.**

Tillsatser som ger Serum mot huggormsgift intravenös inf

ViperaTAb 2 st	8 mL
NaCl 9 mg/mL	100 mL

Beredningsinstruktion:

Innehållet från 2 st ampuller ViperaTAb tillsätts till 100 mL NaCl 9 mg/mL.
1 ampull innehåller 4 mL koncentrat (motsvarande 100 mg antigenbindande fragment).

Hela volymen ska ges till patienten oavsett ålder och vikt.

ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 30 minuter

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

ViperaTAb (licensprodukt)

2 st, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Direkt efter iordningställande ska hela volymen ges till patienten.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Huggormsbett

Kontakt med GIC rekommenderas.

Behandling ska ges så tidigt som möjligt vid:

- Alla typer av allmänpåverkan som inte snabbt går i regress eller återkommer.

OCH/ELLER

-Vid snabb progress av lokalreaktionen.

Barn 1 mån - 18 år: 8 ml x 1 (2 st ampuller)

Dosen ska tillsättas till NaCl innan administrering.

Ca 15 - 30 minuter efter att serum administrerats görs en noggrann undersökning av bettstället och lokalreaktionens utbredning markeras med tusch. Allmäntillståndet och lokalreaktionen följs med täta intervaller. När 5 - 6 timmar förflutit efter serumtillförseln rekommenderas ny kontakt med GIC för att diskutera om ytterligare åtgärder är påkallade (t.ex. om dosen behöver upprepas).





Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAB licens) fårserum

ÖVRIG INFORMATION

Alla huggormsbitna barn bör bedömas på sjukhus.

Barn bör i regel observeras i minst 24 timmar efter ankomst till sjukhus då reaktionerna efter huggormsbett kan variera kraftigt. Om serum ges bör barnet observeras i ca 24 timmar efter given dos. Tecken på systempåverkan uppkommer i allmänhet under de närmaste timmarna efter bittet. Naturalförloppet för maximal utbredning av lokalreaktionen är 48 - 72 timmar.

Vid serumtillförsel minskar allmänsymtomen snabbt. Cirkulationspåverkan viker inom 1 timme och GI-symtom inom 2 timmar. Tidig tillförsel av serum är det enda som effektivt kan påverka lokalreaktionens utbredning.

I Sverige har ca 20 % av patienterna som behandlats med Vipera Tab (ett annat serum mot huggormsgift) behövt en andra dos eftersom recidiv av symtomen uppkommit. I några fall har en tredje dos behövt ges i sent skede.

Preparatet Viperfav har en större molekylstorlek vilket medför en längre halveringstid och därmed minskar risken för återkommande giftverkan och behov av upprepad serumtillförsel, se annan instruktion.

Akuta allergiska reaktioner är mycket ovanliga för detta preparat.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Giftinformationscentralen - Antidotregistret

<https://giftinformation.se/Antidot>

Internetadress Giftinformationscentralen - Huggormsbett

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/huggorm/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) ViperaTAB

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3204



Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-05-07
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-05-11
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3204
Versionsnummer, major: 2
Giltig fr o m: 2021-05-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT