

Läkemedel för injektion eller infusion

Reomax, IV inj (Obs 2 steg)

etakrynsyra 1 mg/ml

enl spädn-schema

	<i>pulver</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	50 mg		glukos 50 mg/ml	5 mg/ml
	1 st	+	10 ml	= 10 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inj</i>
steg 2	5 mg/ml		glukos 50 mg/ml	1 mg/ml
	10 ml	+	40 ml	= 50 ml

Beredningsinstruktion: Den medföljande vätskeampullen innehåller glukos 50 mg/ml. Då volymen i denna ampull inte räcker för att späda ner till 1 mg/ml etakrynsyra så ska den medföljande vätskeampullen kasseras. Använd istället glukos 50 mg/ml, 50 ml för spädn i två steg enligt ovan.

Administrering: Ges som långsam injektion alt kort infusion. Vid upprepad dos i perifer infart byt injektionsställe.

Hållbarhet efter iordningställande: 24 tim (fysikalkemisk hållbarhet);

Källa: Licens

Indikation: Hjärtsvikt, njursvikt, oliguri

Vanlig dos: Endos: 0,5-1 mg/kg/dos. Max 3 mg/kg/dag.

Vanlig dos	1 kg	5 kg	10 kg	40 kg
1 mg/kg/dos	1,00 ml	5,00 ml	10,00 ml	40,00 ml