

Rapydan medicinskt plåster 70 + 70 mg

Lidocaine, combinations

Hållbarhet preparat:

Rapydan 70 + 70 mg (Registrerad Produkt)

● 1 st, Medicinskt plåster, Hållbar:

Administreringsätt

Utvärtes: Administreringstid 20-30 min för ytlig venpunktion och 1 timme för bedövning av djupare strukturer.

Vanlig indikation och dos

Förebygga smärta, när Emla inte är lämpligt.

Barn 1-3 år: Max 1 plåster per dygn.

Barn över 3 år: 1 - 2 plåster

Övrig information

Använda plåster ska vikas ihop med häftmassan inåt så att det frisättningsreglerande membranet inte exponeras.

Rapydan ger vasodilatation och kan vara ett alternativ att beakta hos svårstuckna barn.

Värmealstrande.

Ta bort plåster innan MR-undersökning.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sederig vid intensivvård av barn (BIVA), Hämtat: 2014-09-08

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID03665412753849D4C1257BE2001CBFCF?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2014-09-08

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 14:14:23

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 14:14:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3219

ID/spårnummer: 604

Giltig fr o m: 2015-03-24 14:14:23

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

