



Lidokain + Tetrakain utvärtes

(Rapydan, Pliaglis licens) kräm, plåster

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Plåster med lidokain + tetrakain 70 mg + 70 mg (Rapydan)

Kräm med lidokain + tetrakain 70 mg/g + 70 mg/g (Pligalis, licens).
Använd endast vid rest på Rapydan.

ADMINISTRERING

Utvärtes: ej på slemhinnor eller defekt hudbarriär.

Administreringstid 20 - 30 min för ytlig venpunktion och max 1 tim för bedövning av djupare strukturer.

Tetrakain gör att effekten kvarstår i flera timmar efter att plåstret/krämen avlägsnats.

Plåstret ska inte täckas med ett heltäckande förband.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Rapydan 70 + 70 mg (registrerad produkt)

Medicinskt plåster

Förvaras vid högst 25 °C.

Pligalis 70 + 70 mg/g (licensprodukt)

Kräm

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Hållbar 3 mån efter öppnandet.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebygga smärta, när lidokain+prilokain (ex Emla) inte är lämpligt

Barn 1 - 2 år: 1 gram kräm eller 1 plåster per dygn, max 1 tim applikationstid.

Barn från 3 år: 1 - 2 gram kräm eller 1 - 2 plåster samtidigt.

Max 2 gram eller 2 plåster per dygn, max 1 tim applikationstid.

ÖVRIG INFORMATION

Använt plåster ska kasseras som läkemedelsavfall ihopvikta med häftmassan inåt.

Rapydan är värmealstrande under ca 1 tim och ger vasodilatation och kan vara ett alternativ att beakta hos svårstuckna barn.

Ta bort plåster/förband med kräm innan MR-undersökning.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress SFBABI - Sederig vid intensivvård av barn

<https://sfai.se/riktlinje/riktlinjetrad/>

Internetadress SPC Pliaglis

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/14863/smpc>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

PubMed PMID Bond et al. First do no harm: pain relief for the peripheral venous cannulation of adults, a systematic review and network meta-analysis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716082>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



Lidokain + Tetrakain utvärtes

(Rapydan, Pliaglis licens) kräm, plåster



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 3219

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-05-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT