

Sildenafil oralt 10 mg/mL

(Revatio)

Använd spädningsinstruktionen om pulver finns på avdelningen.
Flera styrkor finns, kontrollera noggrant att rätt preparat används.

Ingen spädning: Revatio, ORAL SUSP
10 mg/mL
1 mL

Beredningsinstruktion: Beställ färdigberett från apoteket.

En-stegsspädning:	Revatio		Vatten		ORAL SUSP
	1 flaska	+		=	10 mg/mL
	1 st		90 mL		90 mL

Beredningsinstruktion: Knacka på flaskan för att lösgöra pulvret. Mät upp 2 x 30 mL vatten med medföljande mätglas, tillsätt detta till flaskan. Skaka kraftigt i minst 30 sek. Mät upp ytterligare 30 mL vatten och tillsätt till flaskan. Skaka kraftigt ytterligare 30 sek.

Skriv utgångsdatum på flasketiketten (utgångsdatum är 30 dagar från beredningsdatum).

Administreringsätt

Oralt: Viktigt att skaka den blandade oral suspension ordentligt i minst 10 sekunder innan den avsedda dosen dras upp.

Enteralt i sond: Går att ge i sond

Vanlig indikation och dos

Pulmonell hypertension

0 - 1 år: 1 - 2 mg/kg x 4, max 30 mg/dag

Säkerheten och effekten av Revatio hos barn yngre än 1 år har inte fastställts. Ordinerar i samråd med barnkardiolog.

Över 1 år:

Under 20 kg: 10 mg (= 1 mL) x 3

Över 20 kg: 20 mg (= 2 mL) x 3

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-06-21 13:43:26

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-21 13:43:37

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3220

ID/spårnummer: 1286

Giltig fr o m: 2016-06-21 13:43:37

Utskriftsdatum: 2016-06-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio)

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL		
2 mg/kg	0,2 mL	1 mL		
Under 20 kg: 10 mg			1 mL	
Över 20 kg: 20 mg				2 mL

Hållbarhet preparat:

Revatio (Registrerad Produkt)

10 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: 30 dagar efter beredning. Förvaras vid högst 30 °C.

Övrig information

Innehåller 250 mg sorbitol per mL. Rekommenderat maximalt intag är ca 250 mg sorbitol/kg/dygn, då sorbitol kan ha laxativ effekt.

Referens/Länk

BNF-C sildenafil, Hämtat: 2013-01-21

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP11555>

FASS Revatio oral susp 10 mg/ml, Hämtat: 2013-01-21

<http://www.fass.se/LIF/product?8&userType=0&nplld=20110517000012&DocTypeID=3&UserTypeID=0>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Neonatalverksamheten Karolinska, PPHN, Hämtat: 2012-11-08

[http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vvHandBok/A14A188735B12C29C1257A2A003AF491/\\$File/DJAN8VNEMD.docx?OpenElement](http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vvHandBok/A14A188735B12C29C1257A2A003AF491/$File/DJAN8VNEMD.docx?OpenElement)

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2013-01-18

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2013-01-21

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Sildenafil, G04BE03

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POIFUCF5GVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-06-21 13:43:26

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-06-21 13:43:37

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3220

ID/spårnummer: 1286

Giltig fr o m: 2016-06-21 13:43:37

Utskriftsdatum: 2016-06-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

