

Vätskeersättning (blandas själv)

I första hand används kommersiellt tillgänglig vätskeersättning.

Tillsatser som ger Vätskeersättning (blandas själv)

Blanda och koka upp 1 liter vatten med 30 mL socker (motsvarar 2 matskedsmått) och 2,5 mL salt (motsvarar 0,5 teskedsmått). Låt blandningen därefter svalna. Blandningen är hållbar 24 tim i kylskåp eller 12 tim rumstemp.

| | |
|--------------------------|---------|
| Vatten (från kran) | 1000 mL |
| Socker (strösocker) | 30 mL |
| Salt (bordssalt med jod) | 2,5 mL |

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond

Indikation och dosering

Barn-Indikation: Dehydrering eller annat tillstånd då barnet behöver vätskas upp.

Barn-Dos: Vanlig dos 5% av kroppsvikten givet på 4 timmar.

Referens/Länk

Internetadress Vårdguiden ,(Grade 2A)

<http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Behandlingar/Vatskeersattning/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2013-01-11 11:37:04

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-01-11 13:54:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Identifieringsnummer: 3222

Versionsnummer: 11

Giltig fr o m: 2013-01-11 13:54:07

Utskriftsdatum: 2013-01-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

