

## Uppvätskning: Vätskeersättning (blandas själv)

I första hand används kommersiellt tillgänglig vätskeersättning. Om egen blandning smaka på den färdiga blandningen, saltsmaken ska bara anas.

---

### Tillsatser som ger Uppvätskning: Vätskeersättning

Vatten (från kran)	1000 mL
Socker (strösocker)	30 mL
Salt (bordssalt med jod)	2,5 mL

Beredningsinstruktion: Blanda och koka upp 1 liter vatten med 30 mL socker (motsvarar 2 matskedsmått) och 2,5 mL salt (motsvarar 0,5 teskedsmått). Låt blandningen därefter svalna. Blandningen är hållbar 24 tim i kylskåp eller 12 tim rumstemp.

---

### Administreringsätt

Oralt  
Enteralt i sond

---

### Vanlig indikation och dos

**Dehydrering eller annat tillstånd då barnet behöver vätskas upp.**

Vanlig dos 5% av kroppsvikten givet på 4 timmar.

### Referens/Länk

Internetadress Vårdguiden ,(Grade 2A)

<http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Behandlingar/Vatskeersattning/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-12-16 10:24:09  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-16 10:12:53  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3222  
ID/spårnummer: 1789  
Giltig fr o m: 2016-12-16 10:12:53  
Utskriftsdatum: 2016-12-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

