

Uppvätskning: Vätskeersättning (blandas själv)

I första hand används kommersiellt tillgänglig vätskeersättning. Om egen blandning smaka på den färdiga blandningen, saltsmaken ska bara anas.

Tillsatser som ger Uppvätskning: Vätskeersättning

Vatten (från kran)	1000 mL
Socker (strösocker)	30 mL
Salt (bordssalt med jod)	2,5 mL

Beredningsinstruktion: Blanda och koka upp 1 liter vatten med 30 mL socker (motsvarar 2 matskedsmått) och 2,5 mL salt (motsvarar 0,5 teskedsmått). Låt blandningen därefter svalna. Blandningen är hållbar 24 tim i kylskåp eller 12 tim rumtemp.

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Dehydrering eller annat tillstånd då barnet behöver vätskas upp.

Vanlig dos 5% av kroppsvikten givet på 4 timmar.

Referens/Länk

Internetadress Vårdguiden

<http://www.varldguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Behandlingar/Vatskeersattning/>

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3222

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-01-18 13:20:34

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-01-18 13:36:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3222

ID/spårnummer: 1871

Giltig fr o m: 2017-01-18 13:36:42

Utskriftsdatum: 2017-01-18

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

