

## Dexdor 8 mikrog/ml IV inf

OBS Flera olika styrkor finns. Kontrollera att rätt spädningsinstruktion är vald.  
 Detta är den högre koncentrationen på 8 mikrog/ml som rekommenderas ges i central infart.

### En-stegspädning till 8 mikrog/mL 50 mL

INFKONC LÖSN		Glukos 50 mg/ml alt NaCl 9		IV
100 mikrog/mL	+	mg/ml	=	<b>8 mikrog/mL</b>
4 mL		46 mL		50 mL

### En-stegspädning till 8 mikrog/mL 100 mL

INFKONC LÖSN		Glukos 50 mg/ml alt NaCl 9		IV
100 mikrog/mL	+	mg/ml	=	<b>8 mikrog/mL</b>
8 mL		92 mL		100 mL

### Farmaceutiska uppgifter

Dexdor (Registrerad Produkt)

8 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning, Hållbar: 24 tim bytesintervall

100 mikrog/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning, Hållbar: Får ej sparas, används direkt

### Administreringsätt

Intravenös kontinuerlig infusion (24 tim)

Rimlig dos i neonatalperioden	0,5 kg	1 kg	3 kg	5 kg
0,2 mikrog/kg/tim	0,01 ml/tim	0,03 ml/tim	0,08 ml/tim	0,13 ml/tim
1,4 mikrog/kg/tim	0,09 ml/tim	0,18 ml/tim	0,53 ml/tim	0,88 ml/tim

### Vanlig indikation och dosering

Indikation: Alfa2-adenoreceptoragonist. Sedering/analgesi inom intensivvård.

Dos: Dosrekommendation för barn saknas i FASS. Vanlig dos: 0,2-1,4 mikrog/kg/tim.

### Substansspecifika uppgifter

Dexmedetomidin, N05CM18

### Referens/Länk

FASS via fass.se Dexdor

[http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel\\_produk.asp?NpID=20101005000010&DocTypeId=7&UserTypeId=2](http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produk.asp?NpID=20101005000010&DocTypeId=7&UserTypeId=2)

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-03-14 08:32:54

Fastställare/läkare: Jonas Berner 2013-03-14 08:37:15

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Identifieringsnummer: 3225

Versionsnummer: 31

Giltig fr o m: 2013-03-14 08:37:15

Utskriftsdatum: 2013-03-14

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## **Dexdor 8 mikrog/ml IV inf**

OBS Flera olika styrkor finns. Kontrollera att rätt spädningsinstruktion är vald.  
Detta är den högre koncentrationen på 8 mikrog/ml som rekommenderas ges i central infart.

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-03-14 08:32:54  
Fastställare/läkare: Jonas Berner 2013-03-14 08:37:15  
Källa: [www.eped.se](http://www.eped.se)  
Kontakt: [barnlakemedel@karolinska.se](mailto:barnlakemedel@karolinska.se)

Identifieringsnummer: 3225  
Versionsnummer: 31  
Giltig fr o m: 2013-03-14 08:37:15  
Utskriftsdatum: 2013-03-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

