



Heparin 20 E/mL i Taurolock instillation

barn under 10 kg

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Beredningsinstruktion:

Extemporeberedning Heparin 20 E/mL i Taurolock. Om färdigblandad lösning ej finns hemma använd Taurolock utan heparin.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Innan instillation ska accessystemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

Instillera därefter Heparin i Taurolock långsamt (inte snabbare än 1 mL/5 sekunder) i subkutan venport (SVP) alt. central venkateter (CVK).

Innan påkoppling av ny parenteral nutrition bör Heparin i Taurolock aspireras och systemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

ÖVRIG INFORMATION

Heparin i TauroLock (tauroolidin) ska användas direkt så snart en hudbrytande och subkutan CVK eller SVP är lagd, för att förebygga bildningen av biofilm med ökad risk för bakteriekolonisering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Heparin i TauroLock (extempore - ej lagervara)

20 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Obruten förpackning 8 dagar i 15 - 30 grader. Får ej frysas. Bruten förpackning får ej sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid förväntad långtidsbehandling med parenteral nutrition.

Till barn mindre än 10 kg:

3 mL av Heparin 20 E/mL i Taurolock instilleras i CVK eller SVP efter avslutad infusion. Max 1 gång/dygn.

Med förväntad långtidsbehandling avses en behandlingstid på mer än 10 dagar.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Taurolock Hemsida

<http://www.taurolock.com>

Internetadress Taurolock hemsida (svenska)

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-04-17

ePedID: 3227

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-17

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT