

## Artesunat intravenös, intramuskulär inj 10 mg/mL (Artesunate Licens)

Doseringsanvisningen på bipacksedeln är missvisande och ska EJ följas.

### Två-stegsspädning

<b>steg1</b>	Artesunate 60 mg 1 st	+	Medföljande vätska 0,6 mL	=	Stamlösning 60 mg/mL 1 mL
<b>steg2</b>	Stamlösning 60 mg/mL 1 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 5 mL	=	INJ LÖ <b>10 mg/mL</b> 6 mL

Beredningsinstruktion: Med varje torrampull om 60 mg följer en ampull med 0,6 mL Natriumbikarbonatlösning 5 % (50 mg/mL). Natriumbikarbonatlösningen injiceras i torrampullen som skakas i 2 - 3 minuter (obs! svåröslig substans, var observant att allt pulvret löst sig och att lösningen är klar). Därefter spädes stamlösningen i 5 mL NaCl 9 mg/mL eller i 5 mL glukos 50 mg/mL. Den iordningställda lösningen måste användas omedelbart.

### Administreringsätt

Långsam intravenös injektion: alternativt intramuskulärt under loppet av ca 2 min. Får EJ ges som intravenös infusion och får EJ ges om lösningen är grumlig.

### Vanlig indikation och dos

#### Falciparum malaria

Barn under 20 kg: 3 mg/kg

Barn över 20 kg: 2,4 mg/kg

Ovanstående doser ska ges initialt samt 12 h och 24h efter första dosen.

Därefter 1 gång dagligen tills patienten kan övergå till peroral behandling, dock så kort tid som möjligt.

### Hållbarhet preparat:

Artesunate (licensprodukt)

● 60 mg/mL, Stamlösning

Hållbar: Får ej sparas pga förväxlingsrisk

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-01 10:48:07

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 15:46:39

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3230

ID/spårnummer: 3291

Giltig fr o m: 2017-06-02 15:46:39

Utskriftsdatum: 2017-06-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Artesunat intravenös, intramuskulär inj 10 mg/mL (Artesunate Licens)

- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning  
Hållbar: Får ej sparas, används direkt

---

### Övrig information

Rapporter finns om allvarlig hemolys 1 - 3 veckor efter påbörjad behandling.  
Kontrollera Hb ca 2 och 3 veckor efter påbörjad behandling

Den intravenösa behandlingen efterföljs alltid av full kur peroral behandling för att förebygga recidiv.

Vid nedsatt njur- och leverfunktion behövs ingen dosjustering.

---

### Referens/Länk

Bok Guidelines for the Treatment of Malaria. 3rd edition

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK294445/>

Internetadress Malaria behandling

<http://www.internetmedicin.se>

Internetadress WHO Model Prescribing Information

<http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/jh2922e/2.5.11.html>

Rekommendation (Grade 2A)

[http://www.essential-evidence-plus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essential-evidence-plus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Artesunate, P01BE03

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-01 10:48:07  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 15:46:39  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3230  
ID/spårnummer: 3291  
Giltig fr o m: 2017-06-02 15:46:39  
Utskriftsdatum: 2017-06-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

