



Amlodipin oralt

(ex Norvasc) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

tablett 2,5 mg (licens) samt 5 och 10 mg (ex Norvasc).

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Norvasc, Amlodipin Krka och Amlodipin Teva har brytskåra och kan delas i två lika stora doser. Övriga tillverkare saknar brytskåra och/eller delbarhetsinformation.

Enteralt i sond: Kan krossas och slammats upp i vatten för omedelbar administrering i sond 8 Fr eller större.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertension

Barn över 6 kg: Initialt 0,1 - 0,2 mg/kg x 1

Alternativt (fast dosering)

Barn 15 - 25 kg: 2,5 mg x 1

Barn över 25 kg: 5 mg x 1. Max 10 mg/dygn.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Svensk Barnnefrologisk Förening, Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-06-25

ePedID: 3235

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-06-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-06-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT