

Ciprofloxacin oralt, tabletter 250, 500 alt 750 mg

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringssätt

Oralt

Enteralt i sond: Krossa och lös upp tabletten i vatten under 2 - 5 minuter.

Ciprofloxacin ska ges minst 1 timme före eller 4 timmar efter läkemedel eller annat (t.ex. mineraltillskott, mjölkprodukter) som innehåller kalcium, magnesium, aluminium eller järn då samtidigt intag påverkar läkemedelsupptaget med sämre effekt som följd.

Vanlig indikation och dos

Urinvägsinfektion: Vid misstänkt njurengagemang eller oklar nivå efter odlingssvar

Neo: 10 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 2, max 750 mg/dag

Dosen kan dubblas vid svår infektion.

Blödande esofagusvaricer och annan akut GI-blödning hos barn med leversjukdom inklusive prehepatisk portatrombos

10 mg/kg x 2, max 750 mg/dos

Svår luftvägsinfektion och pyelonefrit

Neo: 15 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 20 mg/kg x 2, max 750 mg/dos

Nedre luftvägsinfektion vid Cystisk fibros orsakad av Psuedomonas aeruginosa

Barn 1 mån - 18 år: 20 mg/kg x 2, max 750 mg/dos

Behandling och profylax vid postexposition av misstänkt pulmonell antrax

15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-08-24 10:12:44

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-30 09:51:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3237

ID/spårnummer: 1430

Giltig fr o m: 2016-08-30 09:51:21

Utskriftsdatum: 2016-08-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ciprofloxacin oralt, tabletter 250, 500 alt 750 mg

Penicillinallergi vid appendicit med perforation eller generell peritonit

10 mg/kg x 3, max 400 mg/dos

Minst 5 dagars behandling, beakta odlingssvar.

Övrig information

Ciprofloxacin utsöndras i oförändrad form via njurarna. Dosanpassning krävs vid nedsatt njurfunktion.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2013-11-13

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes , Hämtat: 2013-11-13

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Akut appendicit, Hämtat: 2016-08-24

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDCB94CA536DFD9253C12578CD002E9C71?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Blödande esofagusvaricer och annan akut GI-blödning hos barn med leversjukdom, Hämtat: 2016-08-24

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDF3F05D4E4165879C1257A9F0018AB7E?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Handläggning urinvägsinfektion hos barn ALB, Hämtat: 2016-08-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDC2AF13FE73D842B9C1257F17004DC9F2?OpenDocument>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2016-08-24

Substansspecifika uppgifter

Ciprofloxacin, J01MA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POFJUB1AXVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-08-24 10:12:44
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-30 09:51:21
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3237
ID/spårnummer: 1430
Giltig fr o m: 2016-08-30 09:51:21
Utskriftsdatum: 2016-08-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

