

# Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL

(ex Ciproxin), oral suspension

---

**Arbetsmiljö**

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

**Administreringssätt**

Oralt: Skaka noggrant under 15 sekunder före varje användning!

Enteralt i sond: Går att ge i sond men hög risk för ocklusion i små sonder (väldigt tjock, ej vattenlöslig suspension).

Tabletter rekommenderas som förstahandsval för doser över 250 mg.

---

**Vanlig indikation och dos****Urinvägsinfektion: Vid misstänkt njurengagemang eller oklar nivå (t ex barn över 2 år)**

Neo: 10 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg/ x 2, max 750 mg/dag.  
Dosen kan dubblas vid svår infektion.

**Blödande esofagusvaricer och annan akut GI-blödning hos barn med leversjukdom inklusive prehepatisk portatrombos**

10 mg/kg x 2, max 750 mg/dos

**Svår luftvägsinfektion och pyelonefrit**

Neo: 15 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 20 mg/kg x 2, max 750 mg/dos

**Nedre luftvägsinfektion vid Cystisk fibros orsakad av Pseudomonas aeruginosa**

Barn 1 mån - 18 år: 20 mg/kg x 2, max 750 mg/dos

**Behandling och profylax vid postexposition av misstänkt pulmonell antrax**

15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-03-23 11:40:36  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-23 11:48:25  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3238  
ID/spårnummer: 1149  
Giltig fr o m: 2016-03-23 11:48:25  
Utskriftsdatum: 2016-03-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL

(ex Ciproxin), oral suspension

**Penicillinallergi vid appendicit med perforation eller generell peritonit**

10 mg/kg x 3, max 400 mg/dos.

Minst 5 dagars behandling, beakta odlingssvar.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL
15 mg/kg	0,3 mL	1,5 mL	3 mL	15 mL

**Hållbarhet preparat:**

Ciprofloxacin (Registrerad Produkt)

 50 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: 14 dgr vid förvaring antingen i rumstemp eller i kylskåp (2 °C-8 °C).

**Övrig information**

Ciprofloxacin utsöndras i oförändrad form via njurarna. Dosanpassning krävs vid nedsatt njurfunktion.

Ciprofloxacin ska ges minst 1 timme före eller 4 timmar efter intag av mjölkprodukter, då samtidigt intag påverkar läkemedelsupptaget med sämre effekt som följd.

**Referens/Länk**

BNF-C ciprofloxacin, Hämtat: 2016-02-25

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/PHP12891-ciprofloxacin-non-proprietary.htm?q=ciprofloxacin&t=search&ss=text&p=1>

FASS , Hämtat: 2013-11-13

<http://www.fass.se/LIF/substance76&userType=0&substancelid=>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes , Hämtat: 2013-11-13

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Blödande esofagusvaricer och annan akut GI-blödning hos barn med leversjukdom, Hämtat: 2016-02-25

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID0F3F05D4E4165879C1257A9F001BA87E?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Handläggning urinvägsinfektion hos barn ALB, Hämtat: 2016-02-25

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDC2AF13FE73D842B9C1257F17004DC9F2?OpenDocument>

Lokal instruktion, Karolinska Sjukhuset Akut appendicit, Hämtat: 2016-03-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDCB94CA536DFD9253C12578CD002E9C71?OpenDocument>

Pediatric Dosage Handbook ciprofloxacin, Hämtat: 2016-02-25

[http://online.lexi.com/crisql/servlet/crlonline?2a=doc&bc=pdf\\_f&mn=&id=](http://online.lexi.com/crisql/servlet/crlonline?2a=doc&bc=pdf_f&mn=&id=)

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2016-03-09

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-03-23 11:40:36

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-23 11:48:25

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3238

ID/spårnummer: 1149

Giltig fr o m: 2016-03-23 11:48:25

Utskriftsdatum: 2016-03-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL

(ex Ciproxin), oral suspension

---

## Substansspecifika uppgifter

Ciprofloxacin, J01MA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POFJUB1AXVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-03-23 11:40:36  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-23 11:48:25  
Källa: [www.eped.se](http://www.eped.se)  
Kontakt: [barnlakemedel@karolinska.se](mailto:barnlakemedel@karolinska.se)

Läkemedelsnummer: 3238  
ID/spårnummer: 1149  
Giltig fr o m: 2016-03-23 11:48:25  
Utskriftsdatum: 2016-03-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

