



Felodipin oralt

(ex Plendil) depottablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottablett 2,5, 5 och 10 mg (ex Plendil)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Får inte delas, krossas eller tuggas.

Enteralt i sond: Olämpligt

För enteral administrering rekommenderas byte till annan kalciumantagonist ex amlodipin.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Felodipin (registrerad produkt)

2,5 mg, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Gäller även styrkorna 5 och 10 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni

Barn 1 - 18 år: 2,5 mg x 1

Dosen kan trappas upp med 2 veckors-intervall, max 10 mg/dygn

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer, Enteral läkemedelsadministrering

iv.se/enteral-lakemedelsadministrering-sond

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Pediatric Dosage Handbook

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-07-03

ePedID: 3242

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-08-14

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT