



Felodipin oralt

(ex Plendil) depottablett

Miljöbelastande substans, överväg annan kalciumantagonist.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter 2,5, 5 och 10 mg (ex Plendil)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Får inte delas, krossas eller tuggas.

Enteralt i sond: Olämpligt

För enteral administrering rekommenderas byte till annan kalciumantagonist ex amlodipin.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Felodipin (registrerad produkt)

2,5 mg, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Gäller även styrkorna 5 och 10 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni (begränsad evidens)

Barn 6 - 18 år: Startdos 0,1 mg/kg x 1

Dosen kan trappas upp med 2 veckors-intervall, max 0,6 mg/kg/dygn och 10 mg/dygn

Alternativt (fast dosering)

Barn 25 - 50 kg: 2,5 - 10 mg x 1

Barn över 50 kg: 5 - 10 mg x 1

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Enteral läkemedelsadministrering

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/enteral-lakemedelsadministrering-kunskapsstod>

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-08-26

ePedID: 3242

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-26

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT