



Felodipin oralt

(ex Plendil) depottablett

Miljöbelastande substans, överväg annan kalciumantagonist.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter 2,5, 5 och 10 mg (ex Plendil)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Får inte delas, krossas eller tuggas.

Enteralt i sond: För enteral administrering rekommenderas byte till annan kalciumantagonist ex amlodipin.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Felodipin (registrerad produkt)

2,5 mg, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni (begränsad evidens)

Barn 6 - 18 år: Startdos 0,1 mg/kg x 1

Dosen kan trappas upp med 2 veckorsintervall, till 0,6 mg/kg/dygn, max 10 mg/dygn

Alternativt (fast dosering)

Barn 25 - 50 kg: 2,5 - 5 (- 10) mg x 1

Barn över 50 kg: 5 - 7,5 (-10) mg x 1

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Enteral läkemedelsadministrering

www.lakemedelsverket.se/enteral-administrering

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2021-03-24

ePedID: 3242

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-24

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT