

Flukonazol oralt

(ex Diflucan) kapslar

Instruktionen gäller för: Kapslar Diflucan 150 resp 200 mg samt kapslar Flukonazol/Fluconazol/Fluconazole 50, 100, 150 resp 200 mg.

Arbetsmiljö Allergirisk, hantera enligt lokal instruktion, Större exponering kan ge huvudvärk, illamående, magknip, diarré och gasspanning.

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond:

Använd oral suspension i första hand. Kapslarna kan dock öppnas och innehållet hållas i sonden, skölj efter med vatten.

Vanlig indikation och dos

Dosen bör avrundas till närmast antal hela kapslar.

Konstaterad eller misstänkt invasiv candidainfektion inkl. Kryptokockmeningit

Laddningsdos kan ges dag 1: 25 mg/kg, max 800 mg

Barn 1 mån - 18 år: 12 mg/kg x 1, max 600 mg/dos

Behandlingstid:

Invasiv candidainfektion: vanligen 21 dagar, men minst 2 veckor efter symtomfrihet och negativ blododling

Kryptokockmeningit: vanligen 10 - 12 veckor efter negativ likvorodling

Underhållsbehandling för att förhindra återfall av kryptokockmeningit hos barn med hög recidivrisk

Barn 1 mån - 18 år: 6 mg/kg x 1, max 200 mg/dos

Behandlingstid: vanligen 6 - 12 månader

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-09-19 15:45:06
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-20 09:59:51
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3243
ID/spårnummer: 3693
Giltig fr o m: 2017-09-20 09:59:51
Utskriftsdatum: 2017-09-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar

Profylax mot candidainfektion hos patienter med nedsatt immunförsvar

Barn 1 mån - 18 år: (3 -) 6 mg/kg x 1, max 400 mg/dos

Behandlingstid: vanligen 4 - 6 veckor

Mukös candidainfektion

Laddningsdos kan ges dag 1: 6 mg/kg, max 200 mg

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 1, max 100 mg/dos

Vid allvarlig infektion kan dosen ökas upp till 12 mg/kg x 1, max 400 mg/dos.

Behandlingstid: minst 14 - 21 dagar och till minst 2 veckor efter symtomfrihet

Vaginal candida och candida balanit (post pubertet)

Engångsdos 150 mg

Övrig information

Doseringen av flukonazol bör justeras vid nedsatt njurfunktion.

Flukonazol hämmar CYP2C9 (potent hämmare), CYP3A4 (måttlig hämmare) och även CYP2C19 vilket medför risk för interaktion med många andra läkemedel.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Läkemedelsverket, behandlingsrekommendation Svampinfektioner

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso--sjukvard/Behandlings-rekommendationer/Behandlingsrekommendation--listan/Svampinfektioner/>

Internetadress Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

Micromedex

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-09-19 15:45:06
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-20 09:59:51
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3243
ID/spårnummer: 3693
Giltig fr o m: 2017-09-20 09:59:51
Utskriftsdatum: 2017-09-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flukonazol oralt

(ex Diflucan) kapslar

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Fluconazole, J02AC01

<http://www.fass.se/UF/substance?substancelid=IDE4POFIUB1PVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-09-19 15:45:06
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-20 09:59:51
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3243
ID/spårnummer: 3693
Giltig fr o m: 2017-09-20 09:59:51
Utskriftsdatum: 2017-09-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

