



Nifedipin oralt

(ex Adalat) kapslar/tabletter

Nifedipin ska endast användas i undantagsfall eftersom det kan ge svåra oförutsedda förändringar av blodtryck och puls, får inte ges sublinguallt.

Sätt endast in under övervakning på ineliggande patienter.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 20 mg (Adalat)
Depottablett 30 (Adalat Oros)
Licensläkemedel tablett 10 mg, kapsel 5 och 10 mg, samt depottablett 20 och 60 mg.
Depottabletter bör endast användas i undantagsfall.

Instruktionen är mest lämpad för äldre barn. För yngre barn, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: kapslarna, tableterna och depottabletterna ska sväljas hela.

Enteralt: orala droppar rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Nifedipin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Depottablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Nifedipin (licensprodukt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Kapsel, mjuk

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Nifedipin CF och Nifedipin Leading Pharma LLC är även fuktkänsliga. Gäller alla styrkor.

Depottablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni, i undantagsfall när andra antihypertensiva preparat inte har gett effekt

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 0,05 - 0,2 mg/kg x 3 - 6 (tablett, kapsel)
Dosen trappas upp utifrån respons. Vanlig dygnsdos 1 - 2 mg/kg/DYGN, max 120 mg/DYGN

Exempel STARTdosering (tablett, kapsel):

Barn 30 - 59 kg: 5 mg x 3

Barn från 60 kg: 10 mg x 3

Exempel dosering (DEPOTtablett), bör endast användas i undantagsfall:

Barn från 20 kg: 20 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Blodtrycket kontrolleras innan administrering samt 1 timme efter dosändring.

Tabletter kan doseras mindre frekvent jämfört med orala droppar. Detta då läkemedelsupptaget av orala droppar varierar stort vilket kan ge mer svängningar i effekt.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Dionne JM et al. Hypertension in infancy: diagnosis, management and outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21258818>

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



Nifedipin oralt

(ex Adalat) kapslar/tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 3254

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-03-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT