



## Ursodeoxicholsyra oralt

(ex Ursofalk) kapsel/tablett

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel hård 250 mg (ex Ursofalk)  
Filmdragerad tablett 500 mg (ex Ursofalk)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: För administrering i sond rekommenderas oral suspension.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 2 (- 3). Vanlig dygnsdos 20 mg/kg, fördelat på 2 - 3 dosstillfällen, kan ökas till 30 mg/kg/dygn vid behov.

#### Postoperativt efter Kasai operation

Från dag 1 och framåt: 15 - 25 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/kg/dygn  
Uppstart så snart patienten tolererar enteralt intag.

#### Profylax mot levertoxicitet efter stamcellstransplantation

6 mg/kg x 2. Behandlingstid 3 månader.

Om GVHD eller andra tecken på leverskada förlängs behandlingen.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3255](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3255)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-10-05

ePedID: 3255

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-05

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-10-05

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**