



## Ursodeoxicholsyra oralt

(ex Ursofalk) kapsel/tablett

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel hård 250 mg (ex Ursofalk)  
Filmdragerad tablett 500 mg (ex Ursofalk)

Om det inte är lämpligt att avrunda barnets dos till jämna 250 mg rekommenderas att använda oral suspension, se annan instruktion.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Filmdragerad tablett kan delas i två lika stora doser.  
Kapseln ska sväljas hel med vätska, alternativt kan kapseln öppnas och innehållet blandas med t ex lite yoghurt.

Enteralt i sond: För administrering i sond rekommenderas oral suspension.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Kolestas vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 2 (- 3). Vanlig dygnsdos 20 mg/kg, fördelat på 2 - 3 dostillfällen, kan ökas till 30 mg/kg/dygn vid behov.

#### Postoperativt efter Kasaoperation

15 - 25 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/kg/dygn  
Uppstart så snart patienten tolererar enteralt intag.

#### Skleroserande kolangit, gallstenar, transplanterade barn med gallgångsproblem och leverbarn med klåda

6 - 8 mg/kg x 2, alt 12 - 16 mg/kg x 1

Dygnsdosen kan vid behov höjas till 20 mg/kg/dygn.

#### Profylax mot levertoxicitet efter stamcellstransplantation

För att förebygga VOD (veno-ocklusiv sjukdom)/SOS (sinusoidal obstruction syndrome).

6 mg/kg x 2.

Ges från inläggning för start av konditioneringsbehandling till 90 dagar efter stamcellstransplantation.

Om GVHD eller andra tecken på leverskada förlängs behandlingen.





## Ursodeoxicholsyra oralt

(ex Ursofalk) kapsel/tablett

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress VGR, Alfresco SCT-Uppföljning efter allogen SCT

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/18935/SCT%20-%20Uppf%C3%B6ljning%20efter%20allogen%20SCT.pdf?a=false&guest=true>

PubMed PMID Bile acid therapy in pediatric hepatobiliary disease: the role of ursodeoxycholic acid. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9161955>

PubMed PMID Ursodeoxycholic acid for the prevention of hepatic complications in allogeneic stem cell transplantation Ruutu et al. Blood 2002

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12200355>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3255](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3255)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-03-12

ePedID: 3255

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-03-27

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-03-27

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**