



Prednisolon oralt

tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar Prednisolon APL 1 mg (extempore).
Extemporekapslar med valfri styrka.
Tabletter 2,5, 5 och 10 mg (ex Prednisolon Alternova).

Till små barn och administrering via sond rekommenderas oral lösning, se andra instruktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Tabletten kan delas i två lika stora doser. Observera att prednisolontabletter smakar illa, smaken framhävs ytterligare vid delning/uppslamning av tablett.

Enteralt i sond: Lös upp tablett i lite vatten under ca 2 min.

Kapslarna kan öppnas och innehållet blandas med vatten.

Oralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prednisolon (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, gäller samtliga tillverkare och styrkor. För Prednisolon Actavis gäller även att produkten är fuktkänslig.

Prednisolon APL (extempore - lagervara)

1 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammatorisk tarmsjukdom

Barn 2 - 18 år: 0,5 - 2 mg/kg x 1 på morgonen. Vid högdos (dos över 20 mg/dygn) kan dygnsdosen delas upp på 2 dostillfällen. Max 40 (- 60) mg/dygn.

Nedtrappningsschema:

- Vid högdosbehandling ska dygnsdosen sänkas med 10 mg/vecka.

- Vid dygnsdos under 20 mg/dygn ska dygnsdosen sänkas med 5 mg/vecka.

Måttligt till svårt astmaanfall

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg/dygn fördelat på 2 - 3 dostillfällen, max 40 (- 60) mg/dygn.

Behandlingstid: Tre dagar eller längre vid behov.

Exempel på doser per tillfälle:

1 mg/kg/dygn = 0,5 mg/kg x 2 eller 0,33 mg/kg x 3

2 mg/kg/dygn = 1 mg/kg x 2 eller 0,66 mg/kg x 3

Dosen behöver inte trappas ner om barnet står på inhalationssteroider.

Svår systematisk juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Barn 2 - 18 år: 2 mg/kg x 1 på morgonen. Max 60 - 80 mg/dygn. Dosen bör justeras/behandlingen avslutas vid insättning av biologiska läkemedel.

Svår polyartrit

Barn: 0,5 - 1 mg/kg x 1 på morgonen i 10 - 14 dagar. Dosen bör snabbt sänkas till lägsta effektiva dos.

Systemisk lupus erytematosus

Barn: 0,5 - 2 mg/kg/dygn fördelat på 1 - 2 dostillfällen. Max 60 (- 80) mg/dygn.

Exempel på doser per tillfälle:

0,5 mg/kg/dygn = 0,5 mg/kg x 1 eller 0,25 mg/kg x 2

2 mg/kg/dygn = 2 mg/kg x 1 eller 1 mg/kg x 2

Dosen trappas ner under 6 - 8 veckor till lägsta effektiva dos.





Prednisolon oralt

tabletter/kapslar

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Idiopatisk perifer facialispares

Uteslutningsdiagnos. Överväg kortison i nedtrappningsschema.

Barn 15 - 18 år:

Dag 1 - 5: 1 mg/kg x 1 på morgonen, max 60 mg/dygn

Dag 6 - 10: Gradvis dossänkning till 0 mg

Nefrotiskt syndrom

Barn: Initialt 60 mg/m² x 1 under 4 - 6 veckor. Max 60 (- 80) mg/dygn. Dosen sänks sedan till 40 mg/m² x 1 VARANNAN dag, max 40 mg/VARANNAN dag under 4 - 6 veckor tills lägsta möjliga effektiva dos uppnås.

Vid upprepade nefrosskov, profylax:

Barn: 0,25 - 1 mg/kg x 1 eller VARANNAN dag under 3 - 12 månader.

Autoimmun hepatit

Barn: Initialt 2 mg/kg x 1, max 40 - 60 mg/dygn.

Dosen trappas ner under 4 - 8 veckor till lägsta effektiva dos.

Onkologisk indikation

Prednisolon ges även på ett flertal onkologiska indikationer. Var god se respektive protokoll för dosering och behandlingstid.

ÖVRIG INFORMATION

Beakta andra tillstånd som kan påverkas när man behandlar med kortison, t ex tuberkulos, psykisk sjukdom, magsår och diabetes. Konsultera specialist vid behov.





Prednisolon oralt

tabletter/kapslar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Micromedex

Svenska Barnläkarföreningen Akut perifer facialis pares

Svenska Barnläkarföreningen Nefrotiskt syndrom

<https://nefro.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/8/2018/10/nefros-slutversion-SSW180924-181023.pdf>

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi -
Underhållsbehandling av astma hos barn.

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d10_underhallsbeh_astma.pdf

Svenska Barnläkarföreningen SLE

<http://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2019/04/SLE-190405.pdf>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Farmakologiska
behandlingsrutiner för JIA

<http://www.blf.net/reumatologi/vardprogram/FarmBeh.pdf>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi,
Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-04-20

ePedID: 3257

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-04-22

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT