



Dexametason oralt tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Dexametason tabletter 1 mg och 4 mg.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser, gäller båda styrkorna.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond:

Lös tablett i lite vatten och administrera omedelbart i sond. Alternativt finns orala lösningar, se andra instruktioner (licenspreparat).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dexametason oralt (registrerad produkt)

4 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, högst 25 °C. Gäller båda styrkorna.

Dexamethasone Krka är ljus- och fukt känsliga, förvaras i originalförpackning.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viruskrupp

Barn från 1 mån: 0,15 mg/kg, max 10 mg, som engångsdos. Med denna dosering är 1 tablett 1 mg lämplig att ge till barn med vikt ca 7 kg.

Om besvären kvarstår kan eventuellt ytterligare en dos ges. En tredje dos kan ges efter 12 timmar.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Geelhoed GC et al. Oral dexamethasone in the treatment of croup: 0,15 mg/kg versus 0,3 mg/kg versus 0,6 mg/kg. *Pediatr Pulmonol* 1995

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8649915>

PubMed PMID Russell K et al. Glucocorticoids for croup. *Cochrane Database Syst Rev* 2004

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14973975>

PubMed PMID Sparrow A et al. Prednisolone versus dexamethasone in croup: a randomised equivalence trial. *Arch Dis Child* 2006

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16624882>

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-04-09

ePedID: 3269

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-10

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT