



Multivitamin oralt

(Multivitamin droppar Unimedic, Extempore) orala droppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Multivitamin droppar Unimedic.

Vid restsituation kan licenspreparat Abidec Multivitamin drops användas. Observera att dessa droppar inte har exakt samma vitamininnehåll, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Flaskan ska vara kylskåpskall vid iordningställande för en korrekt dosering.
Flaskan ska vändas några gånger fram och tillbaka före användning. Skaka inte kraftigt då det genererar luftbubblor. Håll flaskan lutad ca 45 grader vid droppning.

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Multivitamin droppar Unimedic (lagerberedning)

1 st, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Öppnad flaska är hållbar 1 månad. Om medföljande droppinsats avlägsnas förkortas hållbarheten till 1 vecka.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebygga vitaminbrist under de första levnads månaderna hos prematurfödda barn födda före vecka 35

Barn 1 kg: 0,3 mL = 8 droppar (kan ges som 4 droppar x 2)

Vanligen får barn över 2 kg fulldos bröstmjölkberikning eller prematurformula och då behövs inte multivitamin droppar. Skulle dock multivitamin användas rekommenderas nedanstående dos:

Barn 2 kg: 0,3 mL = 8 droppar*

Barn 3 kg: 0,3 mL = 8 droppar

Barn över 4 kg: 0,2 mL = 5 droppar

5 droppar motsvarar standarddosen D-vitamin som rekommenderas till alla spädbarn (10 mikrog/dag).

*Enligt nationella riktlinjer ges barn 2 kg 11 droppar, men av praktiska skäl doseras ofta alla barn med 8 droppar dagligen.

Avsluta vid 2 månaders korrigerad ålder.

När Multivitamin Unimedic sätts ut ska istället D-vitamin orala droppar 80 E/droppe sättas in.





Multivitamin oralt

(Multivitamin droppar Unimedic, Extempore) orala droppar

ÖVRIG INFORMATION

Föreslagna doser täcker barnets behov av de ingående vitaminerna om barnet i övrigt får oberikad bröstmjolk. Doseringen kan reduceras om barnet får vitaminberikningar via t ex. bröstmjölksberikning eller prematurformula – vid fulldosberikning behövs oftast inte multivitamin droppar.

Mängden fosfat i produkten är 0,3 mmol per mL.

Produkten innehåller polysorbat.

Polysorbat 20 = 15 mg/0,3 mL

Polysorbat 80 = 7,5 mg/0,3 mL

Gränsvärden för dagligt intag av polysorbat till barn varierar i olika källor, men detta är under WHO's gränsvärde för oralt dagligt intag för vuxna (25 mg/kg). För barn runt 1 kg är det viktigt att inte kombinera med andra produkter som innehåller polysorbat pga risk för överdosering av polysorbat.

Mängd vitaminer i 0,3 mL

Vit A: 1857 E = 557 mikrog (retinol)

Vit E: 4,1 E = 4,5 mg (tokoferol)

Vit D3: 588 E = 14,7 mikrog (kolekalciferol)

Vit C: 27,3 mg

Vit B1: 273 mikrog (tiamin)

Vit B2: 274 mikrog (riboflavin)

Vit B3: 4,92 mg (nikotinamid)

Vit B5: 1,38 mg (pantotensyra)

Vit B6: 219 mikrog (pyridoxin)

REFERENS/LÄNK

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Multivitamin droppar

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen, Nyhet - Multivitamin Unimedic restnoterat

<https://neo.barnlakarforeningen.se/2020/07/01/multivitamin-unimedic-restnoterat/>





Multivitamin oralt

(Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-09-01

ePedID: 3272

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-09-01

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-09-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT