

Granisetron (Kytril) IV inj, 1 mg/mL

Hållbarhet och beredningsform

Kytril (Registrerad Produkt)

- 1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Ampullerna är ljuskänsliga och bör förvaras i kartongen.

Administreringsätt

Intravenös injektion (3-5 min): Ordinerad dos dras upp och späds med natriumklorid 9 mg/mL eller glukos 5 % till en totalvolym på 10-30 mL innan administrering.

Ges 5 min innan påbörjad behandling.

Färdigblandad lösning är hållbar i 12 tim vid max 25 grader, 24 tim i kylskåp.

Vanlig indikation

Profylax och behandling av akut illamående och kräkningar i samband med kemoterapi och strålbehandling.

Vanlig dosering

Barn 1 mån- 18 år: 40 mikrog/kg (maxdos 3 mg)

Övrig information

Barn 1 mån- 12 år: Vid behov kan en tilläggsdos ges inom 24 timmar (vänta minst 10 min), maxdos 6 mg/dygn.

Barn över 12 år: Vid behov kan tilläggsdoser ges upp till 2 gånger inom 24 timmar (vänta minst 10 min mellan doserna) maxdos 9 mg/dygn.

Substans

Granisetron, A04AA02

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2013-11-12

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

FASS , Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2013-11-12

http://online.lexi.com/crsql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2013-01-21

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2014-01-30 11:20:20

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-04-08 13:44:27

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3274

ID/spårnummer: 277

Giltig fr o m: 2014-04-08 13:44:27

Utskriftsdatum: 2014-04-08

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

