

Oseltamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

Instruktionen gäller för: Alt. 1: Beredning av oral suspension Tamiflu från flaska, används i första hand.
Alt. 2: Upplösning av Ebilfumin eller Tamiflu kapsel 75 mg i sterilt vatten.

En-stegsspädning:	Oseltamivir		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
Alt. 1	390 mg	+		=	6 mg/mL
	1 flaska		55 mL		65 mL

En-stegsspädning:	Oseltamivir		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
Alt. 2	75 mg	+		=	6 mg/mL
	1 kapsel		12,5 mL		12,5 mL

Arbetsmiljö Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond: Skölj efter med vatten vid administrering i sond.

Vanlig indikation och dos

Behandling av influensa (känsliga influensastammar)

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 12 mån: 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 5 mL x 2

15 kg - 23 kg: 7,5 mL x 2

23 kg - 40 kg: 10 mL x 2

Över 40 kg: 12,5 mL x 2

Behandlingstid: 5 dagar

Vid nedsatt njurfunktion övervägs dosering 1 gång dagligen.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-01-31 11:57:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-31 14:57:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3275

ID/spårnummer: 4267

Giltig fr o m: 2018-01-31 14:57:21

Utskriftsdatum: 2018-01-31

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Oseltamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

Profylaxbehandling av influensa

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 1

Barn 1 - 12 mån: 3 mg/kg x 1

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 5 mL x 1

15 kg - 23 kg: 7,5 mL x 1

23 kg - 40 kg: 10 mL x 1

Över 40 kg: 12,5 mL x 1

Behandlingstid: 10 dagar

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	

Hållbarhet preparat:

Oseltamivir (registrerad produkt)

6 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Beredning från kapsel ska användas direkt. Vid beredning från pulver i flaska kan produkten förvaras 10 dagar i rumstemperatur (bör iordningställas av farmaceut).

75 mg, Kapsel, hård

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Gäller alla styrkor av kapslarna.

Övrig information

Behandlingseffekt tveksam under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Oseltamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till oseltamivirkarboxylat.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?UserType=0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

oseltamivir, J05AH02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=ID11EHMUDF5HK1CSR&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-31 11:57:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-31 14:57:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3275

ID/spårnummer: 4267

Giltig fr o m: 2018-01-31 14:57:21

Utskriftsdatum: 2018-01-31

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

