



## Osetamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Beredning av oral suspension från pulver i flaska, bör användas i första hand.

Alt. 2: Upplösning av kapsel 75 mg i sterilt vatten.

### EN-STEGSSPÄDNING Alt. 1

Osetamivir		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
390 mg	+		=	<b>6 mg/mL</b>
1 flaska		55 mL		65 mL

#### Beredningsinstruktion:

Knacka på flaskan för att lösgöra pulvret. Tillsätt vattnet och skaka ordentligt i 15 sek. Pulvret bidrar med viss volym, därför blir slutvolymen 65 mL efter tillsats av 55 mL vatten. Tänk på att arbeta på ett sådant sätt att exponeringsrisken för damm minimeras.

### EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Osetamivir		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
75 mg	+		=	<b>6 mg/mL</b>
1 kapsel		12,5 mL		12,5 mL

#### Beredningsinstruktion:

Kapseln öppnas genom att hålla den upprätt, knacka ner pulvret i botten och klippa av toppen.

Efter att patientens dos har mätts upp kan en liten mängd, max 1 tesked, sötat livsmedel tillsättas till dosen för att dölja den bittra smaken.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond:

Skölj efter med vatten vid administreringen.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med osetamivir inte är en ersättning för influensavaccination.

#### Behandling av influensa (känsliga influensastammar)

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 12 mån: 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 2 (5 mL x 2)

16 - 23 kg: 45 mg x 2 (7,5 mL x 2)

24 - 40 kg: 60 mg x 2 (10 mL x 2)

Över 40 kg: 75 mg x 2 (12,5 mL x 2)

Behandlingstid: 5 dagar

Vid nedsatt njurfunktion överväg dosering 1 gång dagligen.

#### Profylaxbehandling av influensa

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 1

Barn 1 - 12 mån: 3 mg/kg x 1

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 1 (5 mL x 1)

16 - 23 kg: 45 mg x 1 (7,5 mL x 1)

24 - 40 kg: 60 mg x 1 (10 mL x 1)

Över 40 kg: 75 mg x 1 (12,5 mL x 1)

Behandlingstid: 10 dagar





## Oseltamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

### RIMLIG DOS för Oseltamivir oralt 6 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	-

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Oseltamivir (registrerad produkt)

6 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Beredning från kapsel ska användas direkt. Vid beredning från pulver i flaska kan produkten förvaras 10 dagar i högst 25 °C.

75 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

390 mg, Pulver till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C.

### ÖVRIG INFORMATION

Behandlingseffekt tveksam under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Oseltamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till oseltamivirkarboxylat för att ha effekt.

Effekt har visats då behandlingen inletts inom två dagar efter att symtomen först uppträtt.

Den orala suspensionen innehåller sorbitol (180 mg/mL) som kan ge diarré.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation - Behandling och profylax av influensa med antivirala medel

<https://lv.se/influensaprofylax>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-09-25

ePedID: 3275

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-09-26

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-09-26

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**