



Adrenalin intramuskulär inj

(ex Emerade) förfylld injektionspenna

Använd ej om lösningen är missfärgad eller innehåller partiklar.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning i förfylld injektionspenna:
Emerade 150, 300 och 500 mikrog
EpiPen jr 150 mikrog och EpiPen 300 mikrog
Jext 150 och 300 mikrog
Anapen Junior 0,15 mg/dos och Anapen 0,3 mg/dos

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion: Ska injiceras intramuskulärt i lårets främre, övre, yttre kvadrant.
Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen.
Kan ges genom kläder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adrenalin förfylld injektionspenna (registrerad produkt)

0,15 mg/dos, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna
HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Anapen, Emerade och EpiPen ska förvaras i ytterkartong pga ljuskänslighet, men det behöver inte Jext.
Infomationen gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Anafylaxi

Barn under 20 kg: 150 mikrog/dos = 0,15 mg/dos
Barn 20 - 60 kg: 300 mikrog/dos = 0,3 mg/dos
Barn över 60 kg: 300 - 500 mikrog/dos = 0,3 - 0,5 mg/dos

Ibland kan ytterligare en dos vara nödvändig 5 - 15 minuter efter den första injektionen.

ÖVRIG INFORMATION

Doserna skiljer sig från rekommenderade doser i Fass, vid utfärdande av recept skriv "Obs".

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till eventuell förskrivning av adrenalinpenna.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress VISS Akut astma hos barn och ungdomar - behandling i primärvården
Åtgärder vid anafylaxi (Stockholms läns landsting)

http://www.viss.nu/Global/Bilagor/akut/Atgarder_vid_anafylaxi.pdf

PubMed PMID Brown J. Epinephrine, auto-injectors and anaphylaxis: a challenge of doses, depth and device. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology* 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746901>

Rekommendation (Grade 1A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Sektionen för barn- och ungdomsallergi - Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling

http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-11-08

ePedID: 3276

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-11-13

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-11-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT